

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ
(CARBO ACTIVATUS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: вугілля активоване;

1 таблетка містить 0,25 г вугілля активованого;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, натрію карбоксиметилцелюлоза.

Лікарська форма. Таблетки.

Таблетки чорного кольору без запаху та смаку.

Назва і місцезнаходження виробника. Український консорціум «Екосорб».

Україна, 08130, Києво-Святошинський р-н., с Чайки Петропавлівської Борщагівки,
вул. Грушевського, 60.

Фармакотерапевтична група. Ентеросорбенти. Код АТС А07В А01.

Фармакологічні властивості.

Вугілля рослинного походження, що завдяки спеціальній обробці (активації) набуває великої сорбційної поверхні і здатне поглинати гази, алкалоїди, ендо- та екзотоксини й інші хімічні сполуки. Вугілля активоване у таблетках має дещо меншу адсорбційну здатність, ніж у формі порошку. Препарат не токсичний, добре виводиться з організму через кишечник.

Препарат із кишечника не всмоктується і повністю виводиться з каловими масами через 8-24 години.

Показання для застосування. Гострі отруєння побутовими, промисловими та харчовими отрутами, лікарськими препаратами, отруєння алкалоїдами, солями важких металів; диспепсія, метеоризм, харчові токсикоінфекції.

Протипоказання. Виразки шлунково-кишкового тракту, шлункові кровотечі.

Особливі застереження.

При наявності гіповітамінозу, яким може супроводжуватися тривале застосування вугілля активованого, необхідно призначати полівітаміни. Кал після прийому препарату забарвлюється в чорний колір.

Спосіб застосування та дози. При метеоризмі та диспепсії дорослі приймають від 1 до 3 таблеток 3-4 рази на добу. При отруєннях засіб призначають внутрішньо дорослим у дозі 20-30 г на прийом у вигляді водної зависі (на 1-2 склянки води). Така суспензія використовується і для промивання шлунка. При підвищеній кислотності дорослим призначають 1-2 г препарату 3-4 рази на добу. Для досягнення швидшого та вираженого ефекту таблетки можна подрібнити і приймати у вигляді суспензії (на 0,5 склянки води).

Курс лікування при гострих захворюваннях становить 3-5 днів, при хронічних захворюваннях, які зумовлені ендogenous інтоксикаціями, – 10-15 днів.

Передозування. Значне перевищення максимальних разових доз призводить до побічної дії: нудоти, блювання та запорів.

Побічні ефекти. При застосуванні вугілля активованого можливі запори або проноси, що легко усуваються відміною препарату і призначенням симптоматичної терапії.

При тривалому застосуванні – збіднення організму вітамінами, гормонами, жирами, білками.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Завдяки адсорбуючим властивостям вугілля активоване здатне зменшувати ефективність лікарських засобів, які приймаються одночасно з ним. Тому при супутній фармакотерапії вугілля активоване приймають за 1-1,5 години до або після прийому лікарських засобів.

Термін придатності. Термін придатності препарату – 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в сухому місці, при температурі не вище 30 °С, окремо від речовин та мінералів, які виділяють гази та пари. Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка. Таблетки № 10 у блістері; № 30 (№ 10 x 3) по 3 блістери у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.