

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ТРИСОЛЬ**  
**(TRISOLUM)**

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** прозора безбарвна рідина;

**склад:** 100 мл розчину містять: натрію хлориду – 0,5 г, калію хлориду – 0,1 г, натрію гідрокарбонату – 0,4 г;

**допоміжні речовини:** вода для ін'єкцій.

**Форма випуску.** Розчин для інфузій.

**Фармакотерапевтична група.** Електроліти. Код АТС В05В В01.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Трисоль це сольовий плазмозамінювальний розчин має дезинтоксикаційну дію. Запобігає згущенню крові і розвитку метаболічного ацидозу, зменшує гіповолемію, покращує мікроциркуляцію, функціональний стан серця та нирок, посилює діурез.

**Фармакокінетика.** Розчин швидко виводиться із судинної системи.

**Показання для застосування.** Розчин Трисоль призначають як дезинтоксикаційний засіб, а також для запобігання та усунення зневоднення організму при гострій дизентерії, холері, харчових токсикоінфекціях.

**Спосіб застосування та дози.** Розчин Трисоль вводять внутрішньовенно струминно або крапельно. При тяжких формах патологічних процесів вводять струминно, а потім переходять на внутрішньовенне крапельне введення (40 – 120 крапель за хвилину). Крапельно вводять протягом 24 – 48 годин під контролем лабораторних досліджень. Баланс втраченої рідини і введеного розчину Трисоль визначають кожні 6 годин. Кількість розчину, який необхідний для відновлення об'єму рідини, втраченої при випорожненнях, блюванні, сечо- та потовиділенні, але, як правило, протягом першої години вводять у кількості, що дорівнює 7 – 10% маси тіла. Розчин повинен мати температуру +36 - 38<sup>0</sup>С. При невідкладній регідраційній терапії у випадку гіповолемічного шоку Трисоль вводять струминно протягом 1 – 3 годин. Вища добова доза – 3 л.

**Побічна дія.** Можливий розвиток гіперкаліємії.

**Протипоказання.** Стани, при яких має місце гіперкаліємія.

**Передозування.** Передозування може призвести до розвитку гіперкаліємії. При розвитку гіперкаліємії розчин Трисоль тимчасово замінюють розчином Дисоль до нормалізації електролітного балансу.

**Особливості застосування.** Дітям і вагітним розчин Трисоль вводять під наглядом лікаря. Дози для дітей від 3 мл до 10 мл на 1 кг маси тіла.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Негативних наслідків при взаємодії з іншими лікарськими засобами не виявлено.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати при температурі від 15 до 25 °С. Термін придатності - 3 роки.

**Умови відпуску.** За рецептом.

**Упаковка.** Скляні пляшки по 200, 400 мл.

**Виробник.** Закрите акціонерне товариство "Інфузія", Україна.

**Адреса.** 04073, Київ, Московський проспект, 21-А.

тел.: 490-93-75, 490-93-76.

**Місце провадження діяльності.** 21034, Вінниця, вул. А. Іванова, буд. 55.