

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МЕДАСЕПТ

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: спирт етиловий 96 %;

Лікарська форма.

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Прозора, безбарвна, легка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

Назва і місцезнаходження виробника.

ДП «Межиріцький вітамінний завод» ДАК «Укрмедпром».

Україна, 26510, Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Межирічка, вул. Заводська, 1.

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезінфікуючі засоби.

Код АТС D08A X08.

Фармакодинаміка. При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцеву подразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамотригативних бактерій та вірусів. Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.

Фармакокінетика. При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

Показання для застосування.

Медасепт застосовують як зовнішній антисептичний засіб для дезінфекції шкіри.

Протипоказання.

Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри. Дитячий вік до 14 років.

Підвищена індивідуальна чутливість.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити Вашому здоров'ю.

Особливі застереження.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

Спосіб застосування та дози.

Зовнішньо – наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

Передозування.

При зовнішньому застосуванні випадки передозування не відомі. У разі почервоніння і подразнення шкіри, що є ознаками передозування, необхідно змити рідину водою і припинити застосування препарату.

Побічні ефекти.

При місцевому застосуванні – подразнення шкіри або слизових оболонок. Пригнічення центральної нервової системи.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При зовнішньому застосуванні взаємодія відсутня.

Термін придатності.

Не обмежений.

Умови зберігання.

Зберігати у щільно закритій тарі, у недоступному для дітей місці, подалі від вогню.

Упаковка. По 100 мл у скляних флаконах.

Категорія відпуску. За рецептом.