

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ВЕНІТАН®

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г гелю містить β -есцину 10 мг;

допоміжні речовини: метилпарагідроксibenзоат (Е 218), натрію гідроксид, карбомери (карбоксіполіметилен), пропіленгліколь, полоксамер, вода очищена.

Лікарська форма. Гель.

Безбарвний або злегка опалесціючий гомогенний гель з характерним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз.
1526 Любляна, Веровшкова, 57, Словенія.

Фармакотерапевтична група.

Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Код АТС С05С Х03.

Венітан гель містить β -есцин.

Есцин – це природна суміш тритерпенових сапонінів, що отримують з насіння кінського каштана (*Aesculus hippocastanum L.*), які мають протинабрякові, венотонічні властивості і протизапальну активність. Крім того, есцин діє на початковій стадії запального процесу, яка пов'язана з підвищеною мембранною і капілярною проникністю і продукцією ексудату в прилеглі тканини.

Есцин виявляє антисеротоніновий та антигістамінний ефект.

Есцин інгібує активність простагландин-синтетази. Цей фермент необхідний для утворення простагландинів, які відіграють важливу роль у механізмі запалення.

Есцин запобігає зниженню вмісту АТФ в ендотеліальних клітинах і підвищує активність фосфоліпази А₂, ферменту, що відповідає за вивільнення попередників медіаторів запалення.

Есцин знижує активність лізосомальних ферментів, які розщеплюють протеоглікани, які містяться у стінках капілярів. Це збільшує резистентність капілярів, знижує їхню проникність, зменшуючи таким чином кількість ексудату та утворення набряків.

Венітан® гель призначений для полегшення таких явищ, як набряк, відчуття тяжкості і втоми у ногах, спричинені веностазом нижніх кінцівок. Він є добрим доповненням до компресійної терапії (еластичний биндаж, еластичні панчохи, пов'язки). Крім того, гель зменшує набряк і прискорює резорбцію гематом від ударів і внаслідок інфузій чи ін'єкцій.

Венітан® гель виготовлений на особливій термочутливій основі і легко наноситься на шкіру та сприяє поступовому вивільненню активної речовини.

Показання для застосування.

Варикозне розширення вен, відчуття тяжкості в ногах при вагітності або тривалому стоянні, посттравматичні гематоми і гематоми після ін'єкцій та інфузій.

Протипоказання.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не наносити гель на запалену шкіру, відкриті рани та слизові оболонки. Не втирати при нанесенні. При раптовій появі виражених симптомів венозної недостатності (набряк, зміна кольору шкіри, відчуття напруження та біль), особливо на одній кінцівці, слід виключити тромбоз вен нижніх кінцівок.

Гель містить метилпарагідроксibenзоат (E 218), який може спричинити алергічну реакцію, бронхоспазм, та пропіленгліколь, здатний спричинити подразнення шкіри.

Особливі застереження.***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Венітан® гель можна застосовувати у період вагітності і годування груддю, попередньо проконсультувавшись з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Досвіду застосування препарату дітям не достатньо, тому не рекомендується застосовувати його пацієнтам цієї вікової категорії.

Спосіб застосування та дози.

Наносити тонкий шар гелю на ушкоджену ділянку шкіри та навколо неї 2 - 3 рази на день.

Втирати не треба.

При варикозному захворюванні вен рекомендується одночасне застосування еластичного биндажа або еластичних панчох.

Тривалість лікування залежить від вираженості лікувального ефекту. Якщо після 14 днів терапії покращання не настає, слід звернутися до лікаря. Терапію можна продовжувати до 8 тижнів або до зменшення симптомів.

Передозування.

Немає повідомлень щодо передозування.

Побічні ефекти.

Можливі реакції підвищеної чутливості. У разі виникнення таких реакцій необхідно припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома. Не рекомендується застосовувати гель на одній ділянці шкіри разом з іншими засобами для місцевого застосування.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

ЗАТВЕРДЖЕНО Сторінка 3 з 3. Видаєник: Державний експертний центр МОЗ України
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.