

**І Н С Т Р У К Ц І Я**  
**для медичного застосування препарату**  
**ВЕНІТАН®**  
**(VENITAN®)**

**Загальна характеристика:**

**основні фізико-хімічні властивості:** світло-коричневий гомогенний крем;

**склад:** 1 г крему містить 50 мг екстракту насіння кінського каштана (*Aesculus hippocastanum* L.), до складу якого входить 20 % есцину, що відповідає 1 % есцину у кремі на гідрофільній основі;

**допоміжні речовини:** натрію едетат, кислота сорбінова, гліцеролу моностеарат, вазелін білий, масло мінеральне, спирт цетостеариловий, мігліол 812, пропіленгліколь, кремнію діоксид колоїдний безводний, полімер JP-400 UC, речовина протипінна AF, полісорбат 40, вода очищена.

**Форма випуску.** Крем для зовнішнього застосування.

**Фармакотерапевтична група.** Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Код АТС C05C X03.

**Фармакологічні властивості.** *Фармакодинаміка.* Комплексний препарат рослинного походження переважно з ангіопротекторною активністю.

Венітан® крем є рослинним лікарським засобом для місцевого застосування при захворюванні вен.

Основною активною речовиною є екстракт насіння кінського каштана (*Aesculus hippocastanum* L.). Насіння кінського каштана містить ряд активних інгредієнтів: флавонові глікозиди, кислий сапонін есцин і катехіни. Найважливішим з них є есцин, який підвищує тонус венозних стінок і зменшує ламкість і проникність капілярів. Таким чином зменшується набряк, підвищується кровотік і поліпшується метаболізм в ушкоджених тканинах.

Венітан® крем призначений для полегшення таких явищ, як набряк, відчуття важкості і втоми у ногах, що спричинені веностазом нижніх кінцівок. Він є добрим доповненням до компресійної терапії (затягнуте взуття і бандаж). Крім того, крем зменшує набряк і прискорює резорбцію гематом від ударів і внаслідок інфузій чи ін'єкцій.

*Фармакокінетика.* Не досліджувалась.

**Показання для застосування.** Порушення периферичного кровообігу, варикозне розширення вен, венозна недостатність, відчуття важкості в ногах при вагітності або тривалому стоянні, для зняття набряків м'яких тканин і прискорення розсмоктування посттравматичних гематом і гематом після ін'єкцій.

**Спосіб застосування та дози.**

Наносити тонкий шар крему на шкіру зони ушкодження 2 – 3 рази на день.  
Тривалість застосування залежить від вираженості лікувального ефекту.

**Побічна дія.** Можливі реакції підвищеної чутливості.

Крем містить сорбінову кислоту, яка може спричинювати подразнення.

**Протипоказання.** Гіперчутливість до насіння кінського каштана або інших компонентів препарату.

**Особливості застосування.** Не слід наносити крем на запалену шкіру, відкриті рани та слизові оболонки. Не масажувати при нанесенні. При раптовій появі сильно виражених симптомів венозної недостатності (набряк, зміна кольору шкіри, відчуття напруження та біль), особливо на одній кінцівці, слід виключити тромбоз вен нижніх кінцівок.

*Застосування в періоди вагітності та лактації.* Негативної дії не відмічено. Венітан® крем можна застосовувати при вагітності і в період лактації.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Не відома.**Умови та термін зберігання.** Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Термін придатності - 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

**Умови відпуску.** Без рецепта.**Упаковка.** По 50 г крему в тубах.**Виробник.** Лек фармацевтична компанія д.д.**Адреса.** Веровшкова 57, Любляна, Словенія.