

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

ВЕНІТАН®

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г крему містить сухого екстракту насіння кінського каштана 50 мг, що відповідає есцину 10 мг;

допоміжні речовини: динатрію едетат, кислота сорбінова (Е 200), гліцерол моностеарат, парафін білий м'який, олія мінеральна легка, спирт цетостеариловий, тригліцериди середнього ланцюга, пропіленгліколь, кремнію діоксид колоїдний безводний, полімер JR 400, емульсія симетикону, полісорбат 40, вода очищена.

Лікарська форма. Крем.

Світло-коричневий гомогенний крем.

Назва і місцезнаходження виробника.

Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз.
1526 Любляна, Веровшкова 57, Словенія.

Або:

Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз.
39171 Сюзеталь, Ортштайль Остерведінген, Ланге Герен 3, Німеччина.

Фармакотерапевтична група.

Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Есцин. Код АТС С05С Х03.

Венітан® крем містить β -есцин.

Есцин – це природна суміш тритерпенових сапонінів, отриманих із насіння кінського каштана (*Aesculus hippocastanum L.*), які мають протинабрякові, венотонічні властивості і протизапальну активність. Крім того, есцин діє на початковій стадії запального процесу, що пов'язана з підвищеною мембранною і капілярною проникністю і продукцією ексудату у прилеглі тканини.

Есцин виявляє антисеротоніновий та антигістамінний ефект.

Есцин інгібує активність простагландин-синтетази. Цей фермент необхідний для утворення простагландинів, які відіграють важливу роль у механізмі запалення.

Есцин запобігає зниженню вмісту АТФ в ендотеліальних клітинах і підвищує активність фосфоліпази А₂, ферменту, що відповідає за вивільнення попередників медіаторів запалення.

Есцин знижує активність лізосомальних ферментів, що розщеплюють протеоглікани, які містяться у стінках капілярів. Це збільшує резистентність капілярів, знижує їхню проникність, зменшуючи таким чином кількість ексудату та утворення набряків.

Венітан® крем призначений для полегшення таких явищ як набряк, відчуття тяжкості і втоми у ногах, спричинені веностазом нижніх кінцівок. Він є добрим доповненням до компресійної терапії (еластичний биндаж, еластичні панчохи, пов'язки). Крім того, крем зменшує набряк і прискорює резорбцію гематом від ударів, а також внаслідок інфузій чи ін'єкцій.

Показання для застосування.

Набряки ніг і больові відчуття, пов'язані з венозною недостатністю; варикозне розширення вен; посттравматичні гематоми і гематоми після ін'єкцій та інфузій.

Протипоказання.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не наносити крем на запалену шкіру, відкриті рани та слизові оболонки. Не втирати при нанесенні. При раптовій появі виражених симптомів венозної недостатності (набряк, зміна кольору шкіри, відчуття напруження та біль), особливо на одній кінцівці, слід виключити тромбоз вен нижніх кінцівок.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Венітан® крем можна застосовувати у період вагітності або годування груддю, попередньо проконсультувавшись із лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Досвіду застосування препарату дітям недостатньо, тому не рекомендується застосовувати його пацієнтам цієї вікової категорії.

Спосіб застосування та дози.

Наносити тонкий шар крему на ушкоджену ділянку шкіри та навколо неї 2-3 рази на день.

Втирати не треба.

При варикозному захворюванні вен рекомендується одночасне застосування еластичного биндажа або еластичних панчох.

Тривалість лікування залежить від вираженості лікувального ефекту. Якщо після 14 днів терапії покращання не настає, слід звернутися до лікаря. Терапію можна продовжувати до 8 тижнів або до зменшення симптомів.

Передозування.

Немає повідомлень щодо передозування.

Побічні ефекти.

Можливі реакції підвищеної чутливості (контактний дерматит, подразнення шкіри). У разі виникнення таких реакцій необхідно припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Крем містить пропіленгліколь, що може спричинити подразнення шкіри, сорбінову кислоту (1 200), спирт цетостеариловий, який може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад, контактний дерматит).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Не рекомендується застосовувати крем на одній ділянці шкіри разом з іншими засобами для місцевого застосування.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Сторінка 3 з 3. Видаєник: Державний експертний центр МОЗ України

Зберігати при температурі не вище 25 С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 г крему в тубі; по 1 тубі в картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.