

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГЛІЦЕРИНОВІ СУПОЗИТОРІЇ АМЕДА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: glycerol;

1 супозиторій містить гліцерину 0,88 г або 2,63 г;

допоміжні речовини: кислота стеаринова, натрію гідрокарбонат.

Лікарська форма. Супозиторії ректальні.

Майже білі супозиторії довгастої форми з загостреним кінцем.

Назва і місцезнаходження виробника.

Амеда Фарма Пвт. Лтд, Індія

Шріджі Чамберс, Ние Карго Моторс, Оф. Сі.Г. Роуд, Наврангпура, Ахмедабад-9, Гуджарат, Індія.

Фармакотерапевтична група.

Проносні засоби. Код АТС А06.

У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30 - 50 %), вазеліну, ланоліну. При введенні у пряму кишку супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку і рефлекторним шляхом стимулюють дефекацію.

При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв полегшує виведення калових мас.

Показання для застосування.

Запори різної етіології (коли застосування пероральних препаратів неможливе).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Кишкова непрохідність, ниркова недостатність, апендицит, кровотечі, діарея, геморої в стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недиагностований біль у животі.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не рекомендується застосовувати супозиторії курсом лікування більше 1 тижня.

З обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.

Перед та після застосуванням супозиторіїв слід ретельно вимити руки.

Особливі застереження.***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

У період вагітності препарат можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Невідомо чи екскретує гліцерин у грудне молоко, тому препарат лікар може призначати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Не впливає.

Діти.

Немає обмежень.

Спосіб застосування та дози.

Застосовують по 1 супозиторію 1 раз на добу через 15 - 20 хв після сніданку.

Супозиторій вводять у пряму кишку і тримають там протягом не менше 5 хв, якщо не відбувається випорожнення раніше. Залишки супозиторіїв виводяться з організму разом із каловими масами. За необхідності дозу можна збільшити до 2 супозиторіїв на добу.

Дорослим і дітям старше 5 років призначають по 1 супозиторію (що містить 2,63 г гліцерину) 1 раз на добу. Дітям до 5 років – 1 супозиторій (що містить 0,88 г гліцерину) 1 раз на добу.

Передозування.

Часте рідке випорожнення. Проходить самостійно після відміни препарату.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції; біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча.

При тривалому застосуванні спостерігалися подразнення і неприємні відчуття в прямій кишці; іноді катаральний проктит.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат може взаємодіяти з іншими лікарськими засобами.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі від 2 °С до 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 5 супозиторіїв у стрипі; по 1 стрипу у пачці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.