

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ДЕРЕВІЮ ТРАВА

Склад лікарського засобу. Деревію трава.

Лікарська форма. Трава.

Подрібнена сировина має сірувато-зелений з білувато-жовтуватими вкрапленнями колір. Запах слабкий, ароматний. Смак пряний, гіркуватий.

Назва і місцезнаходження виробника.

Комунальне підприємство Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика».
Україна, м. Київ, вул. Комінтерну, 16.

Фармакотерапевтична група.

Гемостатичні засоби рослинного походження. Код АТС В02В Х04.

Препарати із трави деревію, що містить комплекс біологічно активних речовин (алкалоїд ахілеїн, ефірну олію, глікозиди – апігенін і лотеолін, дубильні речовини, смоли, амінокислоти, органічні кислоти, каротин, вітамін К, аскорбінову кислоту, гіркі речовини) посилюють згортання крові, чинять протизапальну, бактерицидну, антиалергічну дію, виявляють спазмолітичний ефект щодо гладких м'язів кишечника, сечовивідних і жовчних шляхів.

Показання для застосування.

Деревію траву застосовують як кровоспинний засіб та засіб, який покращує функцію шлунково-кишкового тракту. Як кровоспинний засіб призначають при маткових кровотечах внаслідок розвитку фіброміом, запальних процесів.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість, вагітність, підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний при вагітності. За необхідністю застосування препарату в період годування груддю лікар повинен визначити співвідношення користь/ризик.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не встановлена.

Діти.

Безпека та ефективність застосування деревію трави у дітей не встановлені, тому дітям віком до 12 років препарат не застосовують.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки деревію трави кладуть в емальований посуд, заливають склянкою (200 мл) окропу, закривають кришкою і витримують у киплячій воді (на водяній бані) 15 хв. Охолоджують до кімнатної температури, проціджують. Залишок віджимають і доводять кип'яченою водою до початкового об'єму 200 мл. Дорослі та діти старше 12 років приймають внутрішньо у теплом вигляді по 1/4 склянки 2 - 4 рази на добу за 15 - 20 хв до їди з невеликою кількістю води. Тривалість лікування залежить від форми, тяжкості захворювання, ефективності препарату, а також від характеру комплексної терапії.

Передозування.

Не виявлене.

Побічні ефекти.

Не встановлені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому місці при температурі 15 - 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Приготовлений настій – у прохолодному (8 - 15 °С) місці не більше 2-х діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках.

Категорія відпуску.

Без рецепта.