

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
ОБЛІПИХОВА ОЛІЯ
(*Hippophaeae oleum*)

Загальна характеристика:

міжнародна назва: Hippophae rhamnoides;

основні фізико-хімічні властивості: оліїста рідина оранжево-червоного кольору, з характерним запахом. Допускається наявність незначного осаду, розчинного при нагріванні до 40°C;

склад: 100 г олії містять суми каротиноїдів (у перерахунку на β-каротин) не менше 180 мг.

Форма випуску. Олія.

Фармакологічна група. Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм. Антацидні, противиразкові та вітрогінні засоби. Код АТС А02Х.

Фармакологічні властивості. Препарат рослинного походження, олія з плодів обліпихи. Зменшує пошкоджуючу дію токсинів, перекисів, інших агресивних факторів і захищає клітинні оболонки, внутрішньоклітинні структури завдяки наявності в складі природних біологічно активних речовин. Препарат стимулює процеси загоєння при ураженнях шкірних покривів і слизових оболонок, чинить певну антибактеріальну (пригнічує ріст бактерій), обволікаючу та жовчогінну дію. Обліпихова олія сприятливо впливає на процеси клітинного живлення, роботу органів травлення.

Фармакокінетика. Дослідження фармакокінетики препарату не проводилося, тому що препарат містить різні біологічно активні речовини.

Інтенсивність усмоктування препарату залежить від способу застосування. Продукти обміну обліпихової олії при застосуванні внутрішньо виводиться з калом і сечею.

Показання до застосування. Обліпихову Олію застосовують зовнішньо при лікуванні опіків, пролежнів, променевих уражень шкіри і слизових оболонок, гінекологічних захворювань (кольпітів, ендocerвіцитів, ерозій шийки матки), проктологічної патології (ерозивно-виразкових, атрофічних та інших патологій прямої кишки, тріщини анусу, геморою). Внутрішньо приймають у складі комплексного лікування патології стравоходу, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. У формі інгаляцій застосовують при лікуванні хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів (носоглотки, голосових зв'язок, трахеї, бронхів). Місцево препарат застосовують для лікування хронічної патології мигдаликів та у відновлювальний період після гострої патології мигдаликів (тонзилітів, ангін), гайморових порожнин (гайморитів).

Спосіб застосування та дози. Препарат застосовують зовнішньо, внутрішньо чи у вигляді інгаляцій.

2

При патологічних процесах шкіри препарат використовують зовнішньо, через день, у вигляді масляних пов'язок після очищення ураженої поверхні шкіри від некротичних тканин до появи ділянок тканинної регенерації.

При гінекологічних захворюваннях – кольпіти, ендocerвіцити – ватними тампонами, змоченими в Обліпиховій Олії, змащують стінки піхви, піхв'яну частину і канал шийки матки (після їх попередньої обробки); при ерозії шийки матки застосовують ватні тампони, рясно змочені олією (тампони щільно притискають до місця ерозії, процедуру заміни тампонів проводять щодня). Курс лікування кольпіту становить 10-15 процедур, ендocerвіту та ерозії шийки матки

становить 8-12 процедур. За необхідності курс лікування можна повторити через 4-6 тижнів. При проктологічних захворюваннях – тріщини анусу, геморої – ватними тампонами, змоченими у Обліпиховій Олії, змащують анус і гемороїдальні вузли; при патологічних процесах прямої кишки олію вводять в її просвіт за допомогою мікроклізми (попередньо зробивши очисну клізму). Курс лікування – 10-12 процедур. За необхідності курс лікування можна повторити через 4-6 тижнів.

При патології стравоходу, при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки препарат приймають внутрішньо, по 1 чайній ложці, 2-3 рази на день. Курс лікування перерахованих захворювань складає 3-4 тижня. За необхідності курс лікування можна повторити через 4-6 тижнів. При патології ЛОР-органів – хронічний тонзиліт, стан після ангіни, хронічний фарингіт, ватними тампонами, змоченими в Обліпиховій Олії, змащують мигдалики, глотку; при хронічному гаймориті змочені в олії марлеві турунди вводять у зовнішні носові ходи (попередньо звільнивши їх від вмісту). Курс лікування при патології ЛОР-органів становить 8-10 процедур. За необхідності курс лікування можна повторити через 4-6 тижнів.

При захворюваннях верхніх дихальних шляхів препарат застосовують у вигляді інгаляцій, в умовах медичних закладів.

Побічна дія. Гіркота в роті (при внутрішньому застосуванні) і відчуття печіння (при зовнішньому застосуванні), можлива індивідуальна непереносимість препарату. При інгаляційному способі застосування можливе порушення дихання через спазм бронхів, надмірне виділення слини.

Протипоказання. Індивідуальна непереносимість препарату. Препарат протипоказаний при запальних процесах жовчного міхура, печінки, підшлункової залози; жовчнокам'яній хворобі.

Передозування. При передозуванні можливо виникнення нудоти, блювання, головного болю, сплутаності свідомості, судом, проносу, шкірного висипу, десквамації епітелію. Може розвиватися олігурія. В окремих випадках виникають шоківні стани.

У такому разі необхідне промивання шлунка, призначення активованого вугілля чи інших адсорбентів та відповідна симптоматична терапія.

Особливості застосування.

Препарат слід з обережністю застосовувати у хворих, схильних до алергічних реакцій.

З обережністю застосовують препарат у дітей, вагітних жінок та матерів-годувальниць. Перед застосуванням збовтувати.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Патологічний вплив на організм людини через взаємодію Обліпихової Олії з іншими лікарськими засобами не описаний.

Умови та термін зберігання. Зберігають у прохолодному (8–15°C), захищеному від світла, недоступному для дітей місці. Термін придатності – 1 рік 6 місяців.

3

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 50 мл у флаконах.

Виробник. Комунальне підприємство Київської обласної ради “Фармацевтична фабрика”

Адреса. Україна, 01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16.