

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ
(VALERIANAE EXTRACT)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: двоопуклі таблетки в оболонці, жовтого кольору;

склад: 1 таблетка містить: валеріани екстракту густого 20 мг;

допоміжні речовини: магнію карбонат основний, цукор молочний, натрію кроскармелоза, олія рицинова, кислота стеаринова, гідроксипропілметилцелюлоза, тальк, полівінілпіролідон, цукор-рафінад, аеросил, титану діоксид, віск бджолиний, парафін, олія соняшникова, тартразин.

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група.. Снодійні і седативні препарати.

Код АТС N05 C M09

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Препарат зменшує збудливість центральної нервової системи. Дія обумовлена вмістом ефірної олії, більша частина якої складний ефір спирту борнеолу та ізовалеріанової кислоти. Седативні властивості мають також валепотріати і алкалоїди – валерин і хотинін. Седативна дія проявляється повільно, але досить стабільно. Валеріанова кислота і валепотріати мають слабу спазмолітичну дію. Препарат практично не викликає відчуття втоми, не впливає на розумову та фізичну працездатність.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Показання для застосування. Підвищена нервова збудливість, безсоння, мігрень; у складі комбінованої терапії при легких функціональних порушеннях з боку серцево-судинної системи та травного тракту.

Спосіб застосування та дози. Застосовується внутрішньо дорослим по 2 – 4 таблетки 3 рази на добу. Дітям віком до 6 років – по 1 таблетці 3 рази на добу. Тривалість курсу лікування 14 днів.

Побічна дія. Сонливість, пригнічення, зниження працездатності, які минають при зменшенні дози або (у разі їх прояву) відміни препарату.

Протипоказання. Підвищена чутливість до препаратів валеріани; депресія або інші стани, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи.

Передозування. Можливе посилення описаних побічних ефектів. Лікування симптоматичне.

Особливості застосування. Лікувальна дія проявляється при систематичному і тривалому лікуванні. При застосуванні препарату не спостерігається розвитку лікарської залежності.

Застосування в період вагітності і годування груддю можливе лише у разі, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плоду або дитини.

При застосуванні препарату слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Посилює ефект снодійних, седативних засобів, спазмолітиків.

Умови та термін зберігання. Зберігають у сухому, недоступному для дітей місці при температурі 8 – 15°C.

Термін придатності -3

роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. 50 таблеток у блістері або по 10×5 таблеток у блістері і пачці.

Виробник. АТ "Галичфарм".

Адреса. Україна, 79024, м.Львів, вул. Опришківська, 6/8