

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЦИКЛОДИНОН
CYCLODYNON

Склад лікарського засобу.

діюча речовина: 1 таблетка містить: 4 мг нативного сухого екстракту плодів прутняка звичайного (*Fructis Agni casti*) (7 – 11 : 1), (екстрагент етанол 70 % (об/об));

допоміжні речовини: повідон, кремнію оксид колоїдний безводний, крохмаль картопляний, лактози моногідрат, целюлоза мікрористалічна, магнію стеарат, тальк, титану діоксид (E 171), заліза оксид жовтий (E 172), індигокармін (E 132), макрогол 6000, ойдрагіт RL 30 D.

Лікарська форма. Таблетки, вкриті оболонкою.

Круглі, двояковипуклі таблетки, вкриті оболонкою зеленувато-блакитного кольору з матовою поверхнею.

Назва і місцезнаходження виробника. Біонорика АГ, Керхенштейнерштрассе, 11-15, 92318, м. Ноймаркт, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на статеву сферу.

Код АТС G03X A10**.

Препарат є рослинним лікарським засобом для лікування порушень менструального циклу.

Компоненти препарату чинять нормалізуючу дію на рівень статевих гормонів. Дофамінергічні ефекти препарату спричиняють зниження продукції пролактину, тобто усувають гіперпролактинемію. Підвищена концентрація пролактину порушує секрецію гонадотропінів, унаслідок чого можуть виникнути порушення при дозріванні фолікулів, овуляції та у стадії жовтого тіла, що надалі призводить до дисбалансу між естрадіолом і прогестероном. Цей дисбаланс між статевими гормонами спричиняє менструальні порушення, а також мастодінію. На відміну від естрогенів та інших гормонів, пролактин чинить також пряму стимулювальну дію на проліферативні процеси в молочних залозах, підсилюючи утворення сполучної тканини і розширюючи молочні протоки. Зниження рівня пролактину призводить до зворотного розвитку патологічних процесів у молочних залозах і купірує больовий синдром. Ритмічне вироблення і нормалізація співвідношення гонадотропічних гормонів сприяють нормалізації другої фази менструального циклу.

Показання для застосування.

Порушення менструального циклу і/або безпліддя пов'язане з недостатністю жовтого тіла.

Мастодінія (припухлості та біль молочних залоз), яка часто супроводжується болем (масталгія).

Передменструальний синдром (психологічна лабільність, головний біль або мігрень, запор).

Протипоказання. Не можна застосовувати у випадку підвищеної чутливості до плодів прутняка звичайного або до будь-якого із допоміжних компонентів препарату.

Особливі застереження. При нормалізації менструального циклу може підвищитись вірогідність вагітності. У випадку виникнення болю або набухання молочних залоз, а також при порушеннях менструального циклу рекомендується проконсультуватися з лікарем, оскільки ці симптоми можуть свідчити про захворювання, що потребує медичного дослідження.

Препарат не слід приймати хворим зі спадковою непереносимістю галактози або з порушенням всмоктування глюкози-галактози.

Не допускати передозування при застосуванні особами, із захворюваннями печінки, епілепсією або які перенесли травми головного мозку або захворювання мозку.

- **Застосування у період вагітності або годування груддю.** Не можна застосовувати у період

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Сторінка 2 з 2. Видавець: Державний експертний центр МОЗ України
вагітності або годування груддю (може спричинити до зменшення лактації).

- **Здатність впливати на швидкість реакцій при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** У рекомендованих дозах препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

-**Діти.** Препарат не застосовують дітям до 12 років.

Спосіб застосування та дози. Препарат приймають по 1 таблетці 1 раз на день. Таблетки, вкриті оболонкою, слід ковтати, не розжовуючи, з невеликою кількістю води.

Лікування триває протягом 3 місяців без перерви на час менструації.

Навіть після покращання стану слід продовжити лікування ще протягом декількох тижнів.

Передозування. У випадку передозування лікування симптоматичне.

Побічні реакції. Після застосування лікарських засобів, які містять плоди прутняку звичайного, повідомлялось про такі симптоми, як головний біль, свербіж або шлунково-кишковий дискомфорт, який проявляється нудотою, болем у ділянці шлунка. Можливі прояви підвищеної чутливості у вигляді висипу, кропив'янки, набряку Квінке, утруднення дихання та проковтування. У поодиноких випадках можливі психомоторні збудження, сплутаність свідомості і галюцинації. Дані про частоту виникнення таких можливих небажаних реакцій відсутні.

У разі виникнення будь-яких реакцій хворому слід припинити застосування препарату і звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. На сьогодні відсутні відомості про будь-які взаємодії з іншими лікарськими засобами.

Повідомлялось про допомінергічну дію діючої речовини, яка міститься в цьому препараті. У пацієнтів, які застосовують антагоністи дофамінових рецепторів, можливе взаємне послаблення дії лікарських засобів.

Термін придатності. 3 роки. Не застосувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці! Для захисту від впливу світла зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 15 таблеток, вкритих оболонкою, у блістері; по 2 (№ 30) або 4 (№ 60) блістери у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.