

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН З ГЛІЦЕРИНОМ

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г розчину містить йоду 10 мг, калію йодиду 20 мг;
допоміжна речовина: вода очищена, гліцерин.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування.

Прозора сиропоподібна рідина червоно-бурого кольору із запахом йоду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика»
або ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики.
Код АТС R02A A20.

Люголя розчин з гліцерином чинить бактерицидну дію за рахунок вмісту в ньому вільного йоду. Препарат чинить протимікробну дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, у тому числі на стрептококи, стафілококи, кишкову паличку, клебсієли, вульгарний протей.

Показання для застосування.

Запальні захворювання слизових оболонок глотки та гортані: ларингіт, тонзиліт, фарингіт.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Тяжкі захворювання печінки та нирок. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 5 років.

Належні заходи з безпеки при застосуванні.

Не допускати потрапляння препарату в очі.
Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний у період вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не рекомендується застосовувати дітям до 5 років.

Спосіб застосування та дози.

Для зовнішнього застосування!
Тампоном, змоченим препаратом, змащують уражені слизові оболонки глотки та гортані 3 - 4 рази на день.
Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та його тяжкості.

Передозування.

Можлива поява йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, сльозотеча, слиновиділення, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).
Лікування. негайне припинення застосування препарату та симптоматична терапія.

Побічні ефекти.

При тривалому застосуванні можуть з'явитися явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, сльозотеча, слинотеча, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не застосовувати одночасно з розчином перекису водню та іншими дезінфікуючими засобами.

Термін придатності.

3 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.