

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

ПростаНорм®
(Prostanormum®)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: таблетки двоопуклої форми, вкриті оболонкою рожевато-червонуватого кольору, допускаються світлі вкраплення. На зломі від світло-коричневого кольору з сіруватим відтінком до коричневого кольору з сіруватим відтінком з темними та світлими вкрапленнями.

склад: 1 таблетка містить 0,2 г екстракту сухого суміші трави звіробою, трави золотарника канадського, кореня солодки, кореневищ з коренями ехінацеї пурпурової (1:1:1:1);

допоміжні речовини: у складі ядра – цукор молочний, крохмаль картопляний, цукор, желатин, кальцію стеарат або кислота стеаринова, тальк медичний;

у складі оболонки – полівінілпіролідон низькомолекулярний медичний, цукор, аеросил, тальк медичний, титану діоксид, магнію карбонат основний, олія соняшникова, віск бджолиний, тропеолін 0, кислотний червоний 2С.

Форма випуску. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються в урології. Код АТС G04ВХ.

Фармакологічні властивості. ПростаНорм® має простатотропну дію, обумовлену помірною андрогенною активністю, протизапальними, анальгезивними властивостями, а також здатністю покращувати мікроциркуляцію тканин передміхурової залози; нормалізує діурез. Препарат має бактериостатичну дію на грампозитивні бактерії роду *Staphylococcus* і *Streptococcus* (*Enterococcus*).

Показання для застосування. Хронічний неспецифічний простатит у дорослих (як протизапальний та нормалізуючий діурез засіб).

Спосіб застосування та дози. ПростаНорм® приймають внутрішньо по 1 - 2 таблетки 3 рази на день за 30 хв. до їди або через 40 хв. після їди. Курс лікування до 6 - 7 тижнів. Необхідність проведення повторного курсу лікування залежить від ефективності лікування та перебігу захворювання.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, гострий гломерулонефрит.

Передозування. Випадки передозування не зареєстровані.

Особливості застосування. Враховуючи, що до препарату входить ехінацея, застосовувати слід з обережністю при супутніх захворюваннях, для лікування яких не рекомендують імуностимулюючі засоби.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Явищ несумісності з лікарськими препаратами інших груп не виявлено. Лікування препаратом ПростаНорм® може поєднуватись з біогенними стимуляторами, вітамінами, антибактеріальними препаратами, масажем передміхурової залози та різними фізіотерапевтичними процедурами.

Умови та термін зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, захищеному від світла, сухому місці при температурі не вище 20°C.

Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 30 таблеток у банках полімерних, по 1 банці в пачці з картону.

Виробник. ВАТ „Фармстандарт-Томськхімфарм”, Російська Федерація,
за ліцензійною згодою та під замовлення ЗАТ “ФВК ФармВІЛАР” м. Москва,
тел./факс (495) 712-1081