

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 мл настойки містить кореневиц з коренями ехінацеї пурпурової (1 : 10) 50 мл;

допоміжні речовини: спирт етиловий 50 %.

Лікарська форма. Настойка.

Рідина жовто-бурого кольору з ароматним запахом. Допускається наявність осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Фармацевтична фабрика «Віола».

Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група.

Цитокіни та імуномодулятори. Код АТС L03A X.

Комплекс діючих речовин підвищує фагоцитарну активність нейтрофілів і макрофагів, стимулює синтез інтерлейкіну-1, стимулює трансформацію В-лімфоцитів у плазматичні клітини, покращує функції Т-хелперів. Інулін, лавулоза та бетаїн покращують процеси обміну, особливо в печінці та нирках. Має противірусні, антибактеріальні, протимікотичні властивості.

Показання для застосування.

Імунодефіцитний стан при хронічних рецидивуючих запальних захворюваннях різної локалізації. Стан після антибіотикотерапії, цитостатичної, імунодепресивної, променевої терапії. Початкові прояви ГРВІ, тривале застосування антибіотиків. Місцеве лікування ран, що тривалий час не загоюються.

Противпоказання.

Підвищена чутливість до препаратів ехінацеї, алергія до рослин родини складноцвітих, туберкульоз, лейкоз, ревматизм, захворювання сполучної тканини (колагенози), розсіяний склероз та інші аутоімунні захворювання, СНІД. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітним та жінкам, які годують груддю застосовувати настойку не рекомендується, оскільки препарат містить спирт.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Препарат містить спирт, що слід враховувати особам, які керують автотранспортом або працюють зі складними механізмами.

Діти.

Препарат не застосовують дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Для досягнення швидкого ефекту з початку лікування дорослі приймають по 40 крапель настойки, а потім протягом 2 годин ще 20 крапель. Далі препарат приймають по 20 крапель тричі на добу. Курс лікування – не більше 8 тижнів. Дітям після 12 років настойку призначають у розведенні 1 : 2 або 1 : 3 по 5 - 10 крапель 2 - 3 рази на добу за 30 хв до їди. При лікуванні ран настойку застосовують місцево на уражені ділянки. Зовнішньо застосовують для компресів, тампонів. 20 - 60 крапель настойки розводять у 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду, змочують цим розчином марлю, накладають її на рану і накривають компресним папером. Пов'язку змінюють двічі на добу.

Передозування.

Нудота, блювання, порушення з боку шлунково-кишкового тракту, порушення сну, підвищене збудження нервової системи.

Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливий розвиток алергічних реакцій (гіперемія, висипи, свербіж та набрякання шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в прохолодному (8 - 15 °С), захищеному від світла місці. При зберіганні допускається утворення осаду.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.