

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЦИНКОВА МАЗЬ
(ZINC OINTMENT)

Склад лікарського засобу.

Діюча речовина: 1 г мазі містить цинку оксиду 0,1 г;
допоміжна речовина: парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь 10 %.

Мазь білого чи білого з жовтим відтінком кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"
або ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Фармакотерапевтична група. Препарати з пом'якшувальною і захисною дією.

Код АТС D02A B01**.

Мазь чинить антисептичну, в'язучу та підсушуючу дію. Спричиняє денатурацію білків та утворення альбумінів. Зменшує вираженість ексудації.

Показання для застосування. Препарат призначають при шкірних захворюваннях – екземі, піодермії, дерматитах, попріlostях, пролежнях, переважно з процесом ексудації.

Протипоказання. Гострі гнійні процеси шкіри і прилеглих тканин та підвищена індивідуальна чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Мазь наноситься тільки на неінфіковані ділянки шкіри. Не допускати попадання мазі на слизові оболонки та в очі. У випадку попадання мазі в очі слід промити їх великою кількістю проточної води та звернутися до лікаря.

Особливі застереження.

- **Застосування в період вагітності або годування груддю.** Вагітним та жінкам у період годування груддю лікування призначає лікар за умови, якщо передбачувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

- **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та роботу з іншими механізмами.

- **Діти.** При пелюшковому дерматиті, попріlostях у новонароджених застосовувати за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози. Мазь застосовують зовнішньо, наносять тонким шаром на очищену шкіру 2-3 рази на добу. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від характеру і вираженості симптомів захворювання, досягнутого ефекту, характеру базисної терапії.

Передозування. Не виявлене.

Побічні ефекти. При тривалому застосуванні можливе подразнення шкіри. У деяких випадках, при підвищеній індивідуальній чутливості до препарату, можливі алергічні прояви: свербіж, гіперемія, висип у місці нанесення мазі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не виявлена.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. В захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 20 г у банках, 20 г у тубах.

Категорія відпуску. Без рецепта.