

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

АМІАКУ РОЗЧИН

Склад лікарського засобу:*діюча речовина:* аміак;

1 мл розчину містить аміаку 0,1 г або аміаку розчину концентрованого, в перерахуванні на 25 % 0,44 мл;

допоміжна речовина: вода очищена.**Лікарська форма.** Розчин 10 %.

Прозора, безбарвна з різким запахом, сильнолужної реакції. Допускається наявність блискіток та/або легкої каламуті.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Фітофарм».

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що впливають на респіраторну систему.

Код АТС R07A B12*.

Аміаку розчин належить до лікарських засобів, які подразнюють нервові закінчення. Механізм дії аміаку при вдиханні полягає у рефлекторному збудженні дихального центру через рецептори верхніх дихальних шляхів – закінчення трійчастого нерва. При нанесенні на шкіру чинить подразнювальну та антимікробну дію. Препарат не надходить до кров'яного руслу.

Показання для застосування.

Непритомний стан, при укусах комах.

Протипоказання.

Місцеве застосування протипоказане при дерматитах, екземах, інших шкірних захворюваннях, а також при відкритих травматичних ушкодженнях шкірних покривів. Не застосовувати місцево дітям до 3-х років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Місцеве застосування можливе лише на неушкоджену шкіру.

При випадковому ураженні слизової оболонки ока промивати водою декілька разів (протягом 15 хв з перервою 10 хв) або 5 % розчином борної кислоти. Олії і мазі не застосовують. При ураженні носа і глотки застосовують 0,5 % розчин лимонної кислоти або натуральні соки. У

разі прийому внутрішньо - пити воду, фруктовий сік, молоко, краще – 0,5 % розчин лимонної кислоти або 1 % розчин оцтової кислоти до повної нейтралізації вмісту шлунка.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Особливі застереження.

Відсутні.

Спосіб застосування та дози.

Для збудження дихального центру як засіб швидкої допомоги: невеликий шматочок марлі або вати, змочений розчином аміаку, обережно підносять до носових отворів на 0,5 - 1 с.

При укусах комах розчин аміаку застосовують зовнішньо у вигляді примочок (тривалість процедури – до 30 с).

Передозування.

При вдиханні парів розчину аміаку - рефлекторна зупинка дихання, при місцевому застосуванні – подразнення, дерматити, екземи у місці аплікації. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

При тривалій експозиції (інгаляційне застосування) аміаку розчин може спричинити рефлекторну зупинку дихання. При місцевому застосуванні можливі подразнення, алергічні прояви.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря !

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від 15 С до 25 С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 40 мл, 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.