

ІНСТРУКЦІЯ**для медичного застосування препарату****ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3 %****Склад лікарського засобу:***діюча речовина:* перекис водню;100 мл розчину містить водню пероксиду медичного, в перерахунку на 27 %
вміст водню пероксиду – 11 г;*допоміжні речовини:* натрію бензоат (Е 211), вода очищена.**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування.

Прозора, безбарвна рідина без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.Комунальне підприємство «Луганська обласна «Фармація», Фармацевтична фабрика».
Україна, 91020, м. Луганськ, Степовий тупик, 2.**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТС D08A X01.

При контакті розчину водню пероксиду з ушкодженою шкірою та слизовими оболонками вивільнюється активний кисень, який сприяє очищенню ранової поверхні та інактивації органічних речовин (протеїн, кров, гній). При застосуванні препарату відбувається лише тимчасове зменшення кількості мікроорганізмів. Препарат має кровоспинний ефект.

Показання для застосування.

Препарат застосовують для зупинки капілярної кровотечі при поверхневому ушкодженні тканин, носових кровотечах, для обробки слизової оболонки при стоматитах, пародонтитах, ангінах, гінекологічних захворюваннях, а також при гнійних ранах.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Застосування розчину на пов'язку забезпечує безболісне зняття її з рани. Велика кількість піни, що утворюється, сприяє механічному очищенню рани від гною і тканинного детриту.

Перекису водню розчин слід з обережністю застосовувати для обробки глибоких ран та зрошення порожнин, враховуючи можливість емболій.

Препарат нестабільний у лужному середовищі, у присутності металів, складних радикалів деяких оксидантів, а також на світлі і в теплі. Слід уникати потрапляння розчину в очі.

Особливі застереження.***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Немає протипоказань.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Дітям препарат застосовують за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Водню перексид наносять на ушкоджену ділянку шкіри для дезінфекції ран *per se* (тобто без розведення). Для полоскання розчиняють 1 столову ложку в 1 склянці води; для аплікацій, обробки ранових поверхонь, зупинки кровотечі (капілярної) уражені ділянки обробляють тампоном, просоченим розчином водню перексиду. Тривалість лікування залежить від досягнутого ефекту.

Передозування.

Не спостерігалось.

Побічні ефекти.

Можливе відчуття печіння в момент обробки рани. У деяких випадках при індивідуальній чутливості до компонентів препарату можливе виникнення місцевих алергічних реакцій. При тривалому застосуванні для обробки слизової оболонки рота можлива гіпертрофія сосочків язика.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Взаємодія поки що невідома.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл або 40 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.