

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

Г А С Т А Л

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 таблетка містить 450 мг алюмінію гідроксиду – магнію карбонату гелю, 300 мг магнію гідроксиду;

допоміжні речовини: маніт (Е 421), сорбіт (Е 420), лактоза моногідрат, крохмаль кукурудзяний, натрію цикламат, сахарин натрію, тальк, магнію стеарат, ароматизатор м'яти.

Лікарська форма. Таблетки длясмоктання.

Таблетки від білого до кремового кольору, круглої форми, з рівною і гладенькою поверхнею і скошеними краями.

Назва і місцезнаходження виробника.

Пліва Краків, Фармацевтичний завод АТ.

31-546 Краків, вул. Могильська 80, Польща.

Фармакотерапевтична група.

Препарати для лікування кислотозалежних захворювань. Комбіновані препарати та комплексні сполуки алюмінію, кальцію та магнію. Код АТС А02А D01.

Гастал – буферний антацид, що знижує кислотність шлункового соку та усуває небажані шлункові реакції (біль, печію тощо). Оптимальний антацидний ефект Гасталу полягає у зниженні кислотності, в швидкій і тривалій дії (протягом 2 годин) і забезпечується відповідним складом препарату та співвідношенням двох його активних компонентів.

Алюмінію гідроксид – магнію карбонату гелю є буферною антацидною речовиною, що знижує підвищену кислотність шлункового соку до меж фізіологічних значень (рН 3-5) і забезпечує таким чином нормальний процес травлення без подальшої гіперсекреції. Алюмінію гідроксид адсорбує і преципітує пепсин у шлунковому соку і таким чином оборотно інактивує його.

Магнію гідроксид – небуферний антацидний засіб, що не всмоктується. Чинить виражену швидку і тривалу нейтралізуючу дію, окрім того, виявляє послаблюючий ефект. У сполученні з гідроксидом алюмінію антацидний ефект посилюється і можливість запору зменшується.

Алюмінію гідроксид після реакції з хлористоводневою кислотою шлункового соку в лужному середовищі реагує з фосфатами і карбонатами. У вигляді нерозчинних солей виділяється з калом.

Магнію гідроксид після хімічної реакції виділяється з організму з калом також у вигляді нерозчинних солей.

У хворих з нормальною нирковою функцією Гастал не виявляє системного впливу, оскільки лише незначна кількість препарату всмоктується з травного каналу та швидко виділяється з сечею.

Показання для застосування.

Симптоматична терапія підвищеної кислотності шлункового соку з або без печії, пов'язаної з виразковою хворобою, гастритом, рефлюкс-езофагітом або діафрагмальною грижею.

Протипоказання.

Гіперчутливість до солей магнію та алюмінію або інших компонентів препарату. Ниркова

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

недостатність (гостра та хронічна), хвороба Альцгеймера, гіпофосфатемія. Дитячий вік до 6 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

У хворих з пониженою масою тіла, кахексією, у матерів, які годують груддю, а також у дітей слід з обережністю визначати дозу і тривалість лікування.

Вагітним приймати препарат слід після консультації з лікарем.

Хворим з порушенням функції нирок необхідно уникати тривалого застосування великих доз препарату.

Не застосовувати препарат понад два тижні без рекомендації лікаря.

Гастал слід завжди приймати через 1 годину після їди, оскільки в цьому випадку тривалість його дії значно збільшується.

Гастал містить лактозу, тому пацієнтам з вродженими проблемами непереносимості галактози, дефіциту лактази чи порушення всмоктування глюкози-галактози не слід приймати цей препарат.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності та годування груддю препарат приймають тільки за призначенням лікаря, якщо очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не рекомендується приймати Гастал дітям віком до 6 років.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі та діти старше 12 років: по 1 - 2 таблетки 4 - 6 разів на день, приблизно через 1 годину після їди, а також увечері перед сном (не більше 8 таблеток на добу).

Термін лікування – не більше ніж 2 тижні.

При печії застосовується в такому ж дозуванні незалежно від часу прийому їжі.

Діти віком від 6 до 12 років: по 1 таблетці 4 рази на добу, через 1 годину після їди, а також увечері перед сном (не більше 4 таблеток на добу).

Таблетки Гасталу слід повільно смоктати і ні в якому разі не ковтати цілими.

Передозування.

Високі дози можуть спричинити нудоту, блювання, зниження апетиту, діарею, запор.

При тривалому застосуванні високих доз можуть спостерігатися гіпофосфатемія, гіпокальціємія, гіперкальціурія, м'язова слабкість, зниження сухожильних рефлексів, підвищена втомлюваність, серцеві аритмії, остеомаліяція, остеопороз, гіпермагніємія, гіперальомініємія, енцефалопатія, нефрокальциноз.

При появі симптомів передозування слід промити шлунок і звернутися до лікаря.

Побічні ефекти.

Можливі нудота, блювання, пронос і запор.

При застосуванні рекомендованих доз ці побічні явища виникають дуже рідко.

У поодиноких випадках можливі алергічні реакції (кропив'янка, дерматит, коліт).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Гастал, як і інші антацидні засоби, впливає на всмоктування деяких медикаментів.

З одного боку він підсилює ефект леводопи і налідиксової кислоти, з іншого боку, – пригнічує дію

