

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ХОЛОСАС**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* екстракт шипшини рідкий;  
1 г сиропу (що відповідає 0,7 мл) містить 0,4 г екстракту шипшини рідкого;  
*допоміжна речовина:* цукор-пісок.

**Лікарська форма.** Сироп.

Густа сиропоподібна рідина темно-коричневого кольору зі специфічним запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ВАТ "Вітаміні".  
Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ленінської "Іскри", 31.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, які застосовуються при біліарній патології. Код АТС А05А Х10\*\*.  
Жовчогінний засіб, який посилює утворення жовчі і жовчних кислот. Дія препарату обумовлена вмістом у шипшині органічних кислот та флавоноїдів.

**Показання для застосування.**

Хронічний некалькульозний холецистит, холангіт, хронічний гепатит (як допоміжний засіб).

**Противпоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Обтурація жовчовивідних шляхів, калькульозний холецистит; дитячий вік до 3 років.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Викликає здуття та бурчання в животі, тому приймання сиропу необхідно поєднувати з кропною водою або настоєм плодів кмину, коріандру або кропу.

**Особливі застереження.**

З обережністю застосовують хворим на цукровий діабет (препарат містить цукор), а також пацієнтам, схильним до розвитку алергічних реакцій.

**Застосування в період вагітності або годування груддю.**

З обережністю препарат призначають у період вагітності та годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не відомо.

**Діти.**

Дітям віком до 3-х років препарат не застосовують.

**Спосіб застосування та дози.**

Холосас приймають внутрішньо за 30 хв до їди. За допомогою дозуючого пристрою призначають: дорослим та дітям старше 14 років - по 5 мл 2 - 3 рази на добу; дітям препарат застосовують за призначенням лікаря віком від 3 до 6 років - по 1,25 мл 2 - 3 рази на добу; від 6 до 14 років - по 2,5 мл 2 - 3 рази на добу. Тривалість застосування залежить від характеру і вираженості захворювання та супутньої терапії.

**Передозування.**

У рекомендованих дозах не спостерігалось. При випадковому прийомі великих доз можливе виникнення алергічних реакцій (висипання на шкірі, свербіж, почервоніння шкіри).

**Побічні ефекти.**

Можливі алергічні реакції (висипання на шкірі, свербіж, почервоніння шкіри).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Взаємодія не відома.

**Термін придатності.**

3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі від 8 до 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 130 г у банках, у пачках; по 250 г або по 300 г у флаконах, у пачках.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.