

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГЕВКАМЕН
(GEVCAMEN)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г мазі містить ментолу 0,18 г, камфори рацемічної 0,1 г, олії евкаліптової 0,1 г, олії гвоздичної 0,01 г;
допоміжні речовини: парафін, парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь.

Мазь білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, з характерним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"
або ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю. Код АТС M02A X10.

При зовнішньому застосуванні препарат подразнює нервові закінчення шкіри, чинить відволікаючу, місцеву знеболювальну, протизапальну та протимікробну дію при запаленні, болю в суглобах та м'язах тощо.

Показання для застосування. Неврит, невралгія, міозит, міалгія, артрит, артралгія, ревматизм, ішіас. Застосовують при свербіжі в місцях укусів комах.

Протипоказання. Захворювання шкіри на місці передбачуваного нанесення препарату.

Відома підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Слід дотримуватись обережності при застосуванні мазі. Необхідно стежити за тим, щоб мазь не потрапила в очі та на слизові оболонки. У разі потрапляння мазі в очі та на слизові оболонки слід ретельно промити ці місця великою кількістю проточної води.

Особливі застереження.

Застосування в період вагітності або годування груддю. Вагітним та жінкам у період годування груддю лікування призначає лікар у разі, коли передбачувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Досвіду застосування дітям немає, тому препарат не призначають цій категорії пацієнтів.

Спосіб застосування та дози. Мазь застосовують зовнішньо для розтирань. Кількість застосувань і тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання і вираженості симптомів, досягнутого ефекту, характеру базисної терапії.

Передозування. Не спостерігалось.

Побічні ефекти. Кропив'янка і подразнення шкіри на місці нанесення препарату. У разі виникнення цих небажаних явищ слід відмінити препарат.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не відома.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання. Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 15 г, 25 г у банках, тубах.

Категорія відпуску. Без рецепта.