

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ФУКОРЦИН
FUCORCIN

Склад.

Діючі речовини: 1 мл розчину містять фуксину основного - 4 мг, кислоти борної - 8 мг, фенолу –39 мг, ацетону – 49 мкл, резорцину –78 мг;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування.

Рідина темно-червоного кольору з характерним запахом фенолу.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"

або ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Тел./факс: (0352) 521-444, <http://www.ternopharm.com.ua>.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТС D08A X10**.

Фармакологічні властивості. Активно діючі речовини забезпечують широкий спектр протимікробних ефектів при ураженні шкіри і слизових оболонок патогенними мікроорганізмами. Препарат має фунгіцидну дію при грибкових ураженнях шкіри.

Показання для застосування. Профілактика і лікування захворювань шкіри та слизових оболонок, спричинених чутливими до препарату збудниками.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, хронічні алергічні дерматози; вагітність, період годування груддю, дитячий вік до 1 року.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовувати жінкам у періоди вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не застосовувати дітям віком до 1 року.

Спосіб застосування та дози. Розчином змащують уражені ділянки шкіри і слизових оболонок 1-3 рази на день до клінічного одужання.

Передозування. При застосуванні, переважно при лікуванні дітей, та за умови нанесення препарату на значну поверхню ураження можуть виникнути запаморочення, слабкість, розлади дихання. У разі виникнення таких явищ необхідно забезпечити хворому доступ свіжого повітря, провести симптоматичне лікування.

Побічні ефекти. Короткочасне відчуття печіння та болю. При тривалому застосуванні можливий розвиток дерматитів і місцевих алергічних реакцій. При резорбтивній дії можуть виникати блювання, головний біль, діарея.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Слід уникати одночасного застосування протигрибкових антибіотиків місцевого застосування, таких як гризеофульвін, клотримазол, препаратів, до складу яких входить фенол, борна кислота, а також гормональних препаратів. При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть виникати алергічні реакції.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 25 мл у флаконах.

Категорія відпуску. Без рецепта.