

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**АТФ-ЛОНГ®**  
**(ATP-LONG®)**

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* аденоzin-5'-трифосфато-гістидинато-магнію (ІІ) трикалієва сіль октагідрат з натрію хлоридом;

1 таблетка містить АТФ-ЛОНГу 10 мг або 20 мг із вмістом суми аденонових нуклеотидів 6,3 мг або 12,6 мг відповідно;

*допоміжні речовини:* сахароза (цукроза), лактози моногідрат (таблетоза-80), крохмаль кукурудзяний, кальцію стеарат, натрію бензоат (Е 211), кремнію діоксид колоїдний безводний.

**Лікарська форма.** Таблетки.

*Таблетки по 10 мг:* білого кольору з плоскою поверхнею і фаскою;

*таблетки по 20 мг:* білого кольору з плоскою поверхнею, фаскою та рискою.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ЗАТ НВІЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”.

Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 17.

**Фармакотерапевтична група.** Кардіологічні препарати. Код ATC C01E B10.

АТФ-ЛОНГ® є оригінальним лікарським засобом нового класу речовин – різнолігандних координаційних сполук з макроергічними фосфатами, молекула якого складається з аденоzin-5'-трифосфату (АТФ), амінокислоти гістидину та солей магнію і калію. Завдяки оригінальній структурі молекула чинить характерну тільки для неї фармакологічну дію, яка не є властивою для кожного з її хімічних компонентів (АТФ, гістидин, K<sup>+</sup>, Mg<sup>++</sup>). АТФ-ЛОНГ® стимулює енергетичний обмін, активність іонтранспортних систем мембрани клітин, нормалізує концентрацію іонів калію і магнію, показники ліпідного складу мембрани, активність мембранозалежніх ферментів, покращує антиоксидантну систему захисту міокарда, знижує концентрацію сечової кислоти. АТФ-ЛОНГ® чинить протиішемічну, мембраностабілізуючу, антиаритмічну дію завдяки нормалізації метаболічних процесів у міокарді при ішемії і гіпоксії. АТФ-ЛОНГ® поліпшує показники центральної та периферичної гемодинаміки, коронарного кровообігу, підвищує скоротливу здатність міокарда, функціональний стан лівого шлуночка та серцевий викид, що приводить до підвищення показників фізичної працездатності. В умовах ішемії препарат зменшує споживання міокардом кисню, покращує коронарний кровообіг, активує функціональний стан серця, що приводить до зменшення частоти нападів стенокардії та задишкі під час фізичних навантажень. Препарат відновлює нормальні синусовий ритм у хворих на пароксизмальну надшлуночкову і суправентрикулярну тахікардію, з миготінням і тріпотінням передсердь, а також зменшує активність ектопічних джерел (передсердні та шлуночкові екстрасистоли). АТФ-ЛОНГ® нормалізує концентрацію іонів калію та магнію в тканинах.

**Показання для застосування.**

Препарат призначають у комплексному лікуванні:

ішемічної хвороби серця, нестабільної стенокардії, стенокардії спокою та напруження;

постінфарктного та міокардитичного кардіосклерозу (дифузного та вогнищевого кардіосклерозу);

пароксизмальної надшлуночкової і суправентрикулярної тахікардії та інших порушень ритму; вегето-судинної дистонії;

міокардіодистрофії;

міокардитів;

синдрому хронічної втоми;  
гіперурикемії різного походження;  
з метою підвищення толерантності до фізичних навантажень.

### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до препарату та його компонентів;  
гострий інфаркт міокарда;  
тяжкі форми бронхіальної астми;  
AV-блокади II-ІІІ ступеня;  
гіперкаліємія, гіпормагніємія;  
геморагічний інсульт.

### **Добливі застереження.**

Іри поєднанні атріовентрикулярної блокади з іншими порушеннями ритму препарат не призначають.  
Іри тривалому застосуванні препарату АТФ-ЛОНГ® потрібно контролювати рівень калію і магнію в рові. Небажано застосовувати при значній артеріальній гіпотензії. З обережністю призначати при хильності до бронхоспазмів.

АТФ-ЛОНГ® не можна застосовувати одночасно із серцевими глікозидами у зв'язку з підвищеним ізику виникнення атріовентрикулярної блокади.

Необхідно враховувати, що до складу таблеток в невеликій кількості входять сахароза та лактоза.  
Ід час лікування препаратом АТФ-ЛОНГ® необхідно обмежити вживання продуктів, до складу яких входить кофеїн (кава, чай, напої з колою).

### **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Лінічні дані про безпечностю та ефективністю застосування препаратора в період вагітності або годування руддю відсутні, тому застосування його вагітними жінками протипоказане. При потребі прийому препаратора жінками, які годують груддю, годування на період лікування слід припинити.

### **'здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Інших про здатність препаратору АТФ-ЛОНГ® впливати на швидкість реакції при керуванні втотранспортом або іншими механізмами немає.

### **Ліми.**

Препаратор не застосовують для лікування дітей.

### **Способ застосування та дози.**

Таблетки АТФ-ЛОНГ® приймають під язик (сублінгвально) і тримають до повного розсмоктування.  
Доза – 10-40 мг 3-4 рази на день, незалежно від прийому їжі. Термін лікування визначає лікар, в середньому він становить 20-30 днів. За необхідності курс повторюють через 10-15 днів. Максимальна обова доза - 160 мг.

### **І передозування.**

Іри передозуванні препаратором можливий розвиток брадикардії, виникнення AV-блокади та артеріальної гіпотензії.

Лікування. Необхідно припинити прийом препаратора і почати симптоматичну терапію. При виникненні

радикардії вводять атропіну сульфат.

**Іобічні ефекти.**

Ложливі поява нудоти, неприємних відчуттів в епігастрії, алергічних реакцій. При тривалому та неконтрольованому прийомі – гіперкаліємія або гіpermагніемія.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

АТФ-ЛОНГ® не можна застосовувати одночасно із *серцевими глікозидами* у зв'язку з підвищеннем ризику виникнення атріовентрикулярної блокади. При одночасному прийомі з *калійзберігаючими туретиками, препаратами калію та інгібіторами АПФ* підвищується ризик розвитку гіперкаліємії, з пагнеротом та іншими препаратами магнію – гіpermагніемії. *Дипіридамол* посилює терапевтичний ефект препарату АТФ-ЛОНГ®, а *ксантинолу нікотинат, кофеїн, теофілін, амінофілін* – зменшують. АТФ-ЛОНГ® може посилювати антиангінальну дію бета-адреноблокаторів, нітратів.

**Період придатності.**

рік.

**Мови зберігання.**

берігати в недоступному для дітей, сухому, захищенному від світла місці при температурі від 3 до 5 °C.

**Паковка.**

10 таблеток у блістері; по 4 блістери в пачці.

**Категорія відпуску.**

без рецепта.