

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**СЕНОРМ**  
**(SENORM)**

**Загальна характеристика:**

**міжнародна назва та хімічна назва:** Haloperidol, 4-[4-(пара-хлорфеніл)-4-окси-піперидино]-4'-фторбутирофенон;

**основні фізико-хімічні властивості:** 1.5мг- круглі, плоскі таблетки білого кольору, без покриття, з відтиснутим словом «SUN» на одному боці і лінією розламу на іншому;

5мг- круглі, плоскі таблетки білого кольору, без покриття з лінією розламу на одному боці;

**склад:** кожна таблетка містить галоперидолу – 1,5 мг або 5 мг;

**допоміжні речовини:** лактоза, крохмаль, кальцію фосфат двоаміщений, целюлоза мікрोकристалічні, кремнію двоокис колоїдний, натрію пропілпарабен, бронопол, тальк, магнію стеарат.

**Форма випуску.** Таблетки.

**Фармакотерапевтична група.** Антипсихотичні засоби. Код АТС N05A D01.

**Фармакологічні властивості.**

Препарат виявляє нейрорептичну дію; потенціює ефект снодійних та наркотичних засобів. На відміну від похідних фенотіазину має дофамінергічні властивості, не виявляє гангліотичної дії і не знижує артеріальний тиск.

**Фармакокінетика.**

Всмоктується, в основному, із тонкого кишечника. Біодоступність – 60-70%. При пероральному застосуванні максимальна концентрація в крові досягається через 3-6 год, при внутрішньом'язовому введенні – через 20 хв. При парентеральному введенні 90% дози зв'язується з білками плазми. Метаболізується в печінці. Виводиться з сечею (40%) і калом (60%). Період напіввиведення – 12-32 год.

**Показання для застосування.** Застосовується при шизофренії, галюцинаторно-параноїдній формі, станах психомоторного збудження, галюцинаторном та параноїдному синдромах різного генезу.

**Спосіб застосування та дози.** Препарат приймають через 30 хв після їжі. Початкова доза для дорослих становить 1,5 – 5 мг (1 таблетка по 1,5 мг або 1 таблетка по 5 мг) 2-3 рази на добу. При необхідності дозу підвищують до 15 мг (3 таблетки по 5 мг). Тривалість лікування становить 2-3 місяці. Знижують дозу поступово, підтримуюча доза – 5-10 мг на добу (1-2 таблетки по 5 мг).

Дітям до 5 років призначають 0,75-1,5 мг (1/2 або 1 таблетка по 1,5 мг) на добу розподілені на 2 прийоми.

**Побічна дія.** Екстрапірамідні розлади (паркінсонізм, акінезія), рухове збудження, почуття тривоги, страху, безсоння, головний біль, запаморочення, гіпотензія, шкірні реакції, фотосенсибілізація, лейкопенія.

**Протипоказання.** Органічні захворювання центральної нервової системи, порушення серцевої провідності. Захворювання нирок з порушеннями їх функції.

**Передозування.** Можливий розвиток гострих нейрорептичних реакцій. У тяжких випадках можуть спостерігатися різноманітні форми порушення свідомості, навіть кома. Заходи допомоги: припинення терапії і призначення коректорів, внутрішньовенне введення діазепаму, розчину глюкози, ноотропів, вітамінів групи В та С. В тяжких випадках – плазмаферез.

**Особливості застосування.** Під час прийому препарату забороняється управління транспортними засобами і виконання робіт, які потребують підвищеної концентрації уваги.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами.** Потенціює дію речовин, які пригнічують центральну нервову систему. Добре комбінується з протипаркінсонічними засобами.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Термін зберігання – 5 років

**Умови відпуску.** За рецептом.

**Упаковка.** По 10 таблеток у стрипі, по 10 стрипів у картонній упаковці.

**Виробник.** САН ФАРМАСЬЮТИКАЛ ІНДАСТРІЗ ЛТД.

**Адреса.** Офіс. Acme Plaza, Andheri East, Mumbai 400059, India.

Завод: Сурвей № 214, Гавернмент Індастріал Ерія, Фаза II, Сілвасса – 396 230, (У.Т. Дадра & Нагар Хавелі), Індія.