

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**МАГНІЮ СУЛЬФАТ**

**ікарського засобу:**

*човина:* магнію сульфат;  
містить магнію сульфату 10 г;  
нер містить магнію сульфату 25 г.

**ка форма.** Порошок.

ічний порошок білого кольору або блискучі безбарвні кристали.

**місцезнаходження виробника.**

мацевтична фабрика "Віола".  
м. Запоріжжя, 69063, вул. Кірова, 75.

**отерапевтична група.**

ні проносні засоби. Код АТС А06А D04.

внутрішньо призводить до проносного ефекту. Препарат має також жовчогінну та сечогінну дії.  
ий ефект обумовлений зміною осмотичного тиску, затримкою всмоктування води із кишечника,  
нням і збільшенням об'єму кишкового вмісту, подразненням ентерорецепторів, що сприяє полегшенню  
екації.

**ня для застосування.**

Як антидот при отруєнні солями барію.

**казання.**

на індивідуальна чутливість, гострі запальні захворювання шлунково-кишкового тракту, кишкова  
ність, жовчокам'яна хвороба, обструкція жовчовивідних шляхів, гострі пропасні стани, артеріальна  
я, стани, пов'язані з дефіцитом кальцію та пригніченням дихального центру, тяжка форма ниркової  
ності, вагітність.

**і заходи безпеки при застосуванні.**

т не рекомендується застосовувати систематично.

**зі застереження.**

*вання у період вагітності або годування груддю.*

т протипоказаний під час вагітності. У період грудного вигодовування застосовувати під контролем  
азі, якщо користь для матері переважає ризик для дитини.

*ть впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

зає.

астосування дітям обмежений.

**астосування та дози.**

осний засіб магнію сульфат призначають внутрішньо (на ніч або натщесерце за 30 хв до їди) 1 раз на

Інструкцію завантажено з сайту [www.dovgolit.com](http://www.dovgolit.com)

дорослим – по 10 - 30 г у ½ склянки води, дітям старше 12 років – по 10 г у ½ склянки води, дітям віком 6 років – по 5 до 10 г (тобто від половини до цілого об'єму розчину приготованого із розрахунку 1 г на ½ склянки води).

При наявності запорів застосовують у клізмах – вміст 1 пакету (10 г) розчиняють у 500 мл води та вводять у кількості, призначеній лікарем.

При наявності внутрішньої кровотечі розчинними солями барію призначають дорослим внутрішньо 20 - 25 г порошку, розчиненого у 100 мл води.

#### **Противопоказання.**

Противопоказаннями є діарея, блювання.

Противопоказаннями є внутрішньовенне введення розчину кальцію хлориду або кальцію глюконату – 5-10 мл 10 % розчину, проведення оксигенотерапії, вдихання карбогену, штучне дихання, перитонеальний діаліз або гемодіаліз. Терапія симптоматична.

#### **Ефекти.**

Ефектами є зниження вагітності, загострення запальних процесів у шлунково-кишковому тракті, нудота, блювання. У деяких випадках можливе порушення водно-сольового обміну, атонія товстого кишечника.

#### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Знижує ефект пероральних антикоагулянтів, серцевих глікозидів, фенотіазинів. Знижує абсорбцію тетрациклінів, оксацину, послаблює дію стрептоміцину та тобраміцину.

#### **Складові частини.**

#### **Умови зберігання.**

Зберігати при температурі 15 - 25 °С у щільно закупореній тарі.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

#### **Упаковка.**

7 пакетів; по 25 г у контейнерах.

#### **Умови відпуску.**

Без рецепта.