

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**Бронхіал з ісландським мохом і вітаміном С**  
**BRONCHIAL WITH ICELAND MOSS AND VITAMIN C**

**Загальна характеристика:**

**Фізико-хімічні властивості:** сиропоподібна, прозора або опалесцируюча рідина з невеликим мілкодисперсним осадком від світло коричневого до коричневого кольору, з характерним запахом і смаком рослинного екстракту моху. Рослинні екстракти можуть бути причиною помутніння, яке не впливає на якість і термін придатності препарату;

Склад: 5 мл (6,500 г) сиропу містять:

Екстракту ісландського моху (1:10) 0,650 г,

Аскорбінової кислоти 0,019 г,

Евкалипта 0,0065 г,

Вітаміну С 0,0065 г;

Додаткові речовини: сахароза, калію сорбат, полісорбат 80, макрогол 400, вода очищена, метилпарагіт етиловий.

**Форма випуску.** Сироп.

**Терапевтична група.**

Препарат, що застосовується при кашлі та застудних захворюваннях.

АТХ АТХ R05X.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Натуральний засіб, який застосовується при запаленнях верхніх дихальних шляхів, застудних захворюваннях і грипі, заспокоює подразливий кашель, зменшує відхаркування. Загальнозаспокійливий і спазмолітичний ефект дозволяє приймати препарат навіть при астматичних бронхітах.

Аскорбінової кислоти ісландського моху мають пом'якшувальну, відхаркувальну, бактеріоцидну дію. Імуностимулювальна дія екстрактів сприяє більш швидкому одужанню при захворюваннях дихальних шляхів.

**Фармакокінетика.** Не досліджена.

**Показання для застосування.** Запалення верхніх дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем, астматичні бронхіти, запалення слизових порожнини рота.

**Спосіб застосування та дози.** Дорослим - по 1 столовій ложці, дітям старше 3 років - по чайній ложці 3-5 разів на день.

При вживанні збовтати.

Термін лікування становить 7-10 днів.

**Протипоказання.**

Високі алергічні реакції.

**Протипоказання.**

Знижена чутливість до компонентів препарату.

**Протипоказання.**

Відомо.

**Протипоказання.**

Препарат не впливає на здатність керувати автомобілем або потенційно небезпечними механізмами.

Протипоказання для прийому препарату під час вагітності та годування груддю немає.

Препарат містить сахарозу!

**Протипоказання.**

Відомо.

**Умови та термін зберігання.** Зберігати в сухому, темному і недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Термін придатності – 3 роки.

Рослинні екстракти можуть бути причиною помутніння, яке не впливає на якість і термін придатності препарату.

Термін придатності препарату після відкриття флакону становить 10 днів.

**Умови відпуску.** Без рецепта.

**Упаковка.** 130 г у флаконі і картонній коробці.

320 г у флаконі і картонній коробці.

**Виробник.** Др. Мюллер Фарма.

**Адреса.** Пухов 182

503 41 Градец Кралове

Чеська Республіка.