

**ІНСТРУКЦІЯ
ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ****БРОНХІАЛ З МАТИ-Й-МАЧУХОЮ,
ПОДОРІЖНИКОМ І ВІТАМІНОМ С****ЛАД ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ:**

ЧІ РЕЧОВИНИ: 5 мл сиропу містять:

СІЙ ЕКСТРАКТ МАТИ-Й-МАЧУХИ (1:10)	0,325 г,
СІЙ ЕКСТРАКТ ПОДОРІЖНИКА ЛАНЦЕТНОГО (1:10)	0,325 г,
ОРБИНОВА КИСЛОТА	0,019 г,
АЛПТОВА ОЛЯ	0,0065 г,
ГНА ОЛЯ	0,0065 г;

ЮМІЖНІ РЕЧОВИНИ: САХАРОЗА, КАЛІО СОРБАТ, НАТРІО БЕНЗОАТ (Е 211), ПОЛІСОРБАТ 80, ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ 400 (МАКРОГОЛ 400), ВОДА ОЧИЩЕНА, ЕТАНОЛ 96 %.

ФАРМАКОЛОГІЧНА ФОРМА. Сироп.

ФОРМОПОДІБНА, ПРОЗОРА АБО ОПАЛЕСЦЮВАЛЬНА РІДИНА З НЕВЕЛИКИМ ДРІБНОДИСПЕРСНИМ ОСАДОМ ВІД СВІТЛО-КОРИЧНЕВОГО ДО КОРИЧНЕВОГО КОЛЬОРУ, З ХАРАКТЕРНИМ ЗАПАХОМ І СМАКОМ.

СІЙ ЕКСТРАКТ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЧИНОЮ ПОМУТНІННЯ, ЯКЕ НЕ ВПЛИВАЄ НА ЯКІСТЬ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ПРЕПАРАТУ.

ЗВА І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИРОБНИКА.

МЮЛЛЕР ФАРМА.

УХОВ 182, 503 41 ГРАДЕЦ КРАЛОВЕ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА. ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ КАШЛІ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ. КОД АТС R05X.

ГРУПОВИЙ ЗАСІБ ПРИ КАШЛІ І ЗАПАЛЕННЯХ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ, ЛІКУВАННІ ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І ГРИПУ. ЗАСПОКОЮЄ ПОДРАЗЛИВИЙ КАШЕЛЬ, ПОЛЕГШУЄ ДИХАННЯ.

СІЙ МАТИ-Й-МАЧУХИ ЧИНЯТЬ ВІДХАРКУВАЛЬНУ, ПОМ'ЯКШУВАЛЬНУ, ПРОТИЗАПАЛЬНУ ДІЮ.

СІЙ ПОДОРІЖНИКА ЛАНЦЕТНОГО ЧИНЯТЬ БАКТЕРІОСТАТИЧНУ І БАКТЕРИЦИДНУ ДІЮ.

КАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ.

ЛІКУВАННЯ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ КАШЛЕМ, ГОСТРІ І ХРОНІЧНІ БРОНХІТИ. ЗАПАЛЕННЯ ПОРОЖНИНИ РОТА І ГЛОТКИ.

ПРОТИПОКАЗАННЯ.

АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ НА ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ПРЕПАРАТУ.

ВІСЬОКІ ВІК ДО 3 РОКІВ.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

ОСОБИМ ІЗ РІДКІСНОЮ СПАДКОВОЮ НЕПЕРЕНОСИМІСТЮ ФРУКТОЗИ, ГЛЮКОЗО-ГАЛАКТОЗИ, МАЛЬСОРОБЦІ АБО ЦУКРОВО-ІЗОМАЛЬТОЗНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ТА ХВОРИМ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ СЛІД ВРАХОВУВАТИ, ЩО В 1 ДОЗІ СИРОПУ МІСТИТЬСЯ 3,6 Г САХАРОЗИ.

1 МЛ ПРЕПАРАТУ МІСТИТЬСЯ 2,1 % СПИРТУ.

ЗАСТОСУВАННЯ У ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ АБО ГОДУВАННЯ ГРУДДЮ.

ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ТА ГОДУВАННЯ ГРУДДЮ НЕМАЄ.

УВАГА: НЕ ПІДЛИВАТИ НА ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ ПРИ КЕРУВАННІ АВТОТРАНСПОРТОМ АБО РОБОТІ МАШИНИ МЕХАНІЗМАМИ.

НЕ ВПЛИВАЄ.

І.

ПРЕПАРАТ МОЖНА ЗАСТОСОВУВАТИ ДІТЯМ ВІКОМ ВІД 3 РОКІВ.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Дорослим – по 1 столовій ложці (15 мл), дітям віком від 3 років – по 1 чайній ложці (5 мл) 3-5 разів на день, розбавляючи у гарячому чаї або воді.

ПІСЛЯ ВЖИВАННЯ ЗБОВТАТИ.

ТЕРМІН ЛІКУВАННЯ – 7-10 ДНІВ.

РЕДОЗУВАННЯ.

ВІДОМО.

ПРОТИПОКАЗАННЯ.

АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ НА ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ПРЕПАРАТУ, МОЖЛИВІ АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ У ВИГЛЯДІ КРОПИВ'ЯНКИ АБО ДЕРМАТИТУ. В ОСІБ З ПІДВИЩЕНОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДО

ІНШИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШІ ВИДИ ВЗАЄМОДІЇ. НЕ ВІДОМА.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ. 3 РОКИ.

ТЕРМІН ВІДКРИТТЯ ФЛАКОНА ПІСЛЯ ВІДКРИТТЯ – 10 ДІБ.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. ЗБЕРІГАТИ В СУХОМУ, ТЕМНОМУ І НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ НЕ ВИЩЕ 25 °С.

ПАКЕТУВАННЯ. 130 Г У ФЛАКОНІ І КАРТОННІЙ КОРОБЦІ.
320 Г У ФЛАКОНІ І КАРТОННІЙ КОРОБЦІ.

КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ. БЕЗ РЕЦЕПТА.