

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПРОСТАТИЛЕН
(PROSTATILEN)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: супозиторії сигароподібної форми кремового або кремового з сіруватим відтінком кольору, зі специфічним запахом. Допускається мармуровість.

склад: 1 супозиторій містить простатилену 0,03 г;

допоміжні речовини: диметилсульфоксид, поліетиленоксид 1500.

Форма випуску. Супозиторії ректальні.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при доброякісній гіпертрофії передміхурової залози. Код АТС J04СХ10.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Простатилен виявляє органотропну дію на передміхурову залозу (простатопротекторний ефект). Препарат зменшує набряк і лейкоцитарну інфільтрацію передміхурової залози, поліпшує процеси мікроциркуляції і тромбоцитарно-судинного гемостазу, позитивно впливає на функціональну активність сперматозоїдів.

Простатилен стимулює активність гуморальної ланки імунітету та деяких факторів резистентності організму. Препарат коригує антитілопродукцію та стимулює антимікробну активність нейтрофілів, має протизапальну дію.

Простатилен впливає також на тонус м'язів сечового міхура, включаючи тонус детрузора.

Показання для застосування. Профілактика та лікування хронічного простатиту, доброякісної гіперплазії передміхурової залози, тромбофлебіту, ускладнень після операцій на передміхуровій залозі, вікових порушень її функції. Препарат застосовують при сексуальних розладах, чоловічій безплідності, розладах акту сечовипускання, геморої.

Спосіб застосування та дози. Супозиторій вводять глибоко у задній прохід. Застосовують по 1 супозиторію 1–2 рази на день (уранці та ввечері) протягом 5–10 днів. Тривалість курсу визначається характером та тяжкістю захворювання, досягнутим терапевтичним ефектом, характером терапії (монотерапія або комплексне лікування).

Побічна дія. Алергічні реакції.

Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до складових препарату.

Передозування. На сьогодні про випадки передозування препарату Простатилен не повідомлялося.

Взаємодія з лікарськими засобами. Лікарської взаємодії з препаратом Простатилен не спостерігалось.

Умови відпуску. За рецептом.

Умови та термін зберігання. Термін придатності – 3 роки. Зберігають у сухому, захищеному від світла місці при температурі від +8 до +15⁰С. **Зберігають у недоступному для дітей місці.**

Упаковка. По 5 супозиторіїв у контурних чарункових упаковках.

ЗАТВЕРДЖЕНО Сторінка 2 з 2. Видавник: Державний експертний центр МОЗ України
Виробник. ЗАТ «Лекхім-Харків».

Адреса. Україна, 61115, м. Харків, вул. 17-го Партз'їзду, 36