

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КАНДІД
(CANDID)

Загальна характеристика:

міжнародна та хімічна назви: clotrimazole; дифеніл-(2-хлорфеніл)-1-імідазолілметан;

основні фізико-хімічні властивості: однорідний гель білого кольору;

склад: 1 г гелю містить 20 мг клотримазолу;

допоміжні речовини: спирт цетиловий, пропіленгліколь, гліцерин, спирт бензиловий, віск цетомакрогольний емульсійний, карбопол 940 (карбомер 940), натрію гідроксид, хлоркрезол, вода очищена.

Форма випуску. Гель вагінальний 2%.

Фармакотерапевтична група. Протигрибкові засоби для місцевого застосування. Похідні імідазолу. Код АТС G01A F02.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Протигрибковий препарат, який застосовують для лікування вагінальних інфекцій, спричинених грибами роду *Candida*, *Trichomonas vaginalis*, основними видами грампозитивних та грамнегативних бактерій. Фармакологічна дія гелю зумовлена властивостями клотримазолу, що входить до його складу. До клотримазолу чутливі дерматофіти, дріжджові гриби (роду *Candida*, *Torulopsis glabrata*, *Rhodotorula*), плісняві гриби, а також збудники різнобарвного лишая (*Pityriasis versicolor*) та еритразми. Крім того, клотримазол спричиняє антимікробну дію відносно грампозитивних (стафілококи, стрептококи) та грамнегативних бактерій (*Bacteroides*, *Gardnerella vaginalis*), а також відносно *Trichomonas vaginalis*, *Malasseria furfur*, *Corinebacterium minussimum*. Ефект клотримазолу пов'язаний з порушенням синтезу ергостеролу, який входить до складу клітинної мембрани грибів. Внаслідок цього змінюються структура і властивості мембран, спостерігається лізис клітин.

Фармакокінетика. Не вивчалася.

Показання для застосування. Генітальні інфекції, спричинені чутливими до препарату збудниками: вагінальний кандидоз, вагінальний трихомоніаз, змішані вагінальні інфекції, бактеріальний вагініт та інфекційна лейкорея.

Спосіб застосування та дози. При лікуванні генітальних інфекцій приблизно 5 г гелю (1 повний аплікатор) вводять якомога глибше у вагіну ввечері (перед сном) протягом 6 днів. Лікування не повинно проводитися під час менструації і тому повинно бути закінчено до її початку.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, I триместр вагітності.

Побічна дія. Місцеві алергічні реакції з боку слизової оболонки піхви, почервоніння, відчуття печіння.

Передозування. У зв'язку з низькою абсорбцією препарату передозування малоімовірне.

Особливості застосування. Кандід у формі гелю не застосовують під час менструації.

Щоб запобігти повторному інфікуванню необхідне одночасне лікування обох партнерів.

Кандід не залишає плям на шкірі і одязі.

У II та III триместрах вагітності і в період лактації Кандід застосовують з обережністю і лише під наглядом лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При одночасному застосуванні з амфотерицином В, ністатином активність Кандіду гелю знижується.

Умови та термін зберігання. Зберігати у захищеному від світла місці, при температурі не вище + 25⁰С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності – 3 роки.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. По 30 г гелю у тубі; по 1 тубі з аплікатором у картонній коробці.

Виробник. “Гленмарк Фармасьютікалз Лтд.”

Адреса. Б/2, Махалакшмі Чемберс, 22, Бхулабхай Десай Род, Мумбай, Індія.