

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПЕРТУСИН

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г препарату містить чабрецю екстракту рідкого (1:1) 120 мг, калію броміду 10 мг;
допоміжні речовини: сироп цукровий, етанол 96 %, вода очищена.

Лікарська форма. Сироп.

Коричневого кольору рідина з ароматним запахом.

Назва і місце знаходження виробника.

ВАТ "Фітофарм".

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A10.

Пертусин стимулює відхаркування (секретомоторна дія), пом'якшує кашель та виявляє седативну дію. Препарат стимулює фізіологічну активність миготливого епітелію і перистальтичні рухи бронхіол, сприяючи пересуванню мокротиння з нижніх у верхні відділи дихальних шляхів і його виведенню.

Показання для застосування.

Кашель при трахеїтах, бронхітах, пневмоніях, коклюшу, запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів.

Протипоказання.

Індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату, у тому числі бромідів; декомпенсація серцево-судинної системи, артеріальна гіпотензія, виражений атеросклероз, анемія, хвороби нирок, цукровий діабет, алкоголізм. І триместр вагітності та період годування груддю. Дитячий вік до 3 років.

Належні засоби безпеки при застосуванні.

При застосуванні препарату слід дотримуватись рекомендованих доз.

Особливі застереження.

Хворим на цукровий діабет перед застосуванням препарату необхідна обов'язкова консультація лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

В І триместрі вагітності препарат протипоказаний. В II і III триместрах застосовують з урахуванням співвідношення користь/ризик, яке визначає лікар. На час лікування слід припинити годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Внаслідок того, що препарат містить спирт, пацієнтам слід проявляти обережність при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Діти.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Застосовують дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Пертусин призначають внутрішньо.

Дітям віком до 6 років по 2,5 - 5 мл препарату ($\frac{1}{2}$ - 1 чайна ложка) попередньо розчиненого у 20 мл (2 десертні ложки) охолодженої прокип'яченої води 3 рази на добу.

Дітям віком від 6 до 12 років по 10 -15 мл (1 десертна чи 1 столова ложка) 3 рази на добу.

Дорослим – по 15 мл (1 столова ложка) 3 рази на добу.

Тривалість лікування визначається індивідуально.

Передозування.

При передозуванні можливе посилення побічних ефектів, алергічних реакцій.

Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

При тривалому застосуванні можливі явища бромізму: алергічні реакції, шкірні висипи, риніт, кон'юнктивіт, гастроентероколіт, загальна слабкість, атаксія, брадикардія. Можливі алергічні реакції на складові препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші форми взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

4 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 г або 100 г у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.