

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЛІКОПІД®

Склад.

Діюча речовина: 1 таблетка містить ГМДП (глюкозамінілмураміддипептид)
1 мг або 10 мг;

допоміжні речовини: лактоза водна, сахароза, крохмаль картопляний, метилцелюлоза, кальцію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.

Фармакотерапевтична група. Цитокіни та імуностимулятори.

Код АТС. L03A.

Клінічні характеристики.

Показання.

Комплексна терапія станів, що супроводжуються вторинними імунодефіцитами:

- при гострих та хронічних гнійно-запальних захворюваннях шкіри та м'яких тканин, включаючи гнійно-септичні післяопераційні ускладнення;
- при герпетичній інфекції будь-якої локалізації (у т. при офтальмогерпесі);
- при хронічних вірусних гепатитах В і С.

У дорослих також:

- при хронічних інфекціях легень;
- при папіломовірусній інфекції;
- при псоріазі (включаючи артропатичну форму);
- при туберкульозі легень.

У дітей також:

- при хронічній інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів як у стадії загострення, так і в стадії ремісії.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до препарату, вагітність та період годування груддю, аутоімунний тиреоїдит у фазі загострення, станах при захворюваннях, що супроводжуються тяжкою гарячкою або гіпертермією (>38°C).

Спосіб застосування та дози.

Лікопід застосовується у дорослих сублінгвально або внутрішньо натщесерце за 30 хв. до їди.

Для профілактики післяопераційних ускладнень Лікопід призначають по 1 мг під язик один раз на добу протягом 10 днів. Для лікування гнійно-септичних процесів шкіри та м'яких тканин середньої тяжкості, в тому числі післяопераційних, Лікопід призначають у дозах по 2 мг під язик 2-3 рази на добу протягом 10 днів. При лікуванні тяжких гнійно-септичних процесів Лікопід призначають внутрішньо по 10 мг 1 раз на добу протягом 10 днів.

При хронічних інфекціях легень Лікопід призначають по 1-2 мг під язик 1 раз на добу протягом 10 днів.

При туберкульозі легень Лікопід призначають по 10 мг 1 раз на добу під язик протягом 10 днів.

При герпетичній інфекції у легкій формі Лікопід призначають по 2 мг 1-2 рази на добу під язик протягом 6 днів; при тяжких формах - по 10 мг 1-2 рази на добу під язик протягом 6 днів. При офтальмогерпесі Лікопід призначають внутрішньо у дозі по 10 мг 2 рази на добу протягом 3-х днів. Після триденної перерви курс лікування повторюють.

При ураженнях шийки матки вірусом папіломи людини Лікопід призначають у дозі по 10 мг внутрішньо 1 раз на добу протягом 10 днів.

При псоріазі Лікопід призначають у дозі по 10-20 мг внутрішньо 1-2 рази на добу протягом 10 днів, потім через добу по 10-20 мг протягом наступних 10 днів. При тяжких формах та широкому ураженні (включаючи артропатичну форму) по 10 мг 2 рази на добу протягом 20 днів.

У дітей віком 3-16 років Лікопід застосовується лише у вигляді таблеток по 1 мг внутрішньо.

Для дітей при хронічній інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів як в стадії загострення, так і в стадії ремісії та гнійних інфекціях шкіри Лікопід застосовується у дозі по 1 мг внутрішньо 1 раз на добу протягом 10 днів.

Дітям при лікуванні герпетичної інфекції, незалежно від локалізації, Лікопід призначають у дозі 1 мг внутрішньо 3 рази на добу протягом 10 днів.

Дітям при лікуванні хронічних вірусних гепатитів В і С Лікопід призначають у дозі по 1 мг внутрішньо 3 рази на добу протягом 20 днів.

Побічні реакції.

На початку лікування може відмічатися короткочасне підвищення температури тіла (не вище 37,9°C), що не є приводом для відміни препарату.

Передозування.

Випадків передозування препарату не виявлено.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказане.

Діти.

Для дітей віком 3-16 років Лікопід застосовується лише у вигляді таблеток по 1 мг.

Особливості застосування.

Лікопід застосовується сублінгвально або внутрішньо натщесерце за 30 хв. до їди.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботу з іншими механізмами.

Не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з складними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат підсилює дію антибіотиків з групи напівсинтетичних пеніцилінів, фторхінолонів, цефалоспоринових, полієнових похідних, відмічається синергізм щодо противірусних та антигрибкових препаратів. Антациди та сорбенти значно знижують біодоступність препарату. Глюкокортикостероїди знижують біологічний ефект Лікопиду.

Лікопід не застосовують з сульфаніламідними препаратами, тетрациклінами.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічна активність препарату зумовлена наявністю специфічних центрів зв'язування (рецепторів) до ГМДП, локалізованих в ендоплазмі фагоцитів та Т-лімфоцитів. Препарат стимулює функціональну (бактерицидну, цитотоксичну) активність фагоцитів (нейтрофілів, макрофагів), посилює проліферацію Т- і В-лімфоцитів, підвищує синтез специфічних антитіл. Фармакологічна дія забезпечується шляхом посилення вироблення інтерлейкінів (інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-6, інтерлейкіну-12), фактора некрозу пухлин-альфа, гамма-інтерферону, колонієстимулюючих факторів.

Препарат підвищує активність природних клітин- кілерів.

Фармакокінетика.

Біодоступність препарату при пероральному застосуванні складає 7-13 %. Ступінь зв'язування з альбумінами крові незначний. Активних метаболітів не утворює. Час досягнення максимальної концентрації – півтори години після прийому. Період напіввиведення – 4,29 год. Виводиться з організму у незміненому вигляді, переважно нирками.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості.

Круглі плоскоциліндричні таблетки білого кольору з фаскою. Таблетки з дозуванням 10 мг мають риску.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C.

Упаковка.

Таблетки по 1 мг та 10 мг.

По 10 таблеток у блістері.

По 1 блістеру у пачці.

Категорія відпуску.

За рецептом.

Виробник.

ЗАТ «Пептек».

Місцезнаходження.

Росія, 117997, Москва, вул. Миклухо-Маклая, 16/10.

Тел.: (495) 330-74-56