

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
РЕМЕНС
(REMENS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 таблетка містить: Cimicifuga D1 17,9 мг, Sanguinaria D6 37,2 мг, Jaborandi D6 37,2 мг, Seria D12 37,2 мг, Lachesis D12 37,2;

допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль картопляний, магнію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.

Круглі, плоскі таблетки білого або білого з жовтуватим відтінком кольору з можливими вкрапленнями з розподільною рисою.

Назва і місцезнаходження виробника.

Ріхард Бітгнер АГ

Оссіахерштрассе 7, А-9560 Фельдкірхен, Австрія.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат відновлює гормональний баланс та взаємодії в системі гіпоталамус-гіпофіз-яєчники. Застосування препарату при менструальних порушеннях відновлює регулярність менструального циклу; позбавляє від болю при менструаціях; нормалізує об'єм крові, що втрачається; зменшує прояви передменструального синдрому (дратівливість, плаксивість, схильність до депресії, набряки, огрубіння молочних залоз, висип на шкірі, зниження працездатності, головний біль, вегетативні розлади).

Застосування препарату в передменопаузальному періоді та під час менопаузи запобігає виникненню та усуває клімактеричні порушення: припливи жару, пітливість, напади серцебиття, запаморочення, мігрені; усуває емоційну неврівноваженість, драгівливість, агресивність; покращує настрій; нормалізує жировий обмін, стабілізує артеріальний тиск та зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань; запобігає передчасному старінню та появі надмірної ваги.

При запальних гінекологічних захворюваннях препарат проявляє протизапальну дію, підвищує адаптаційні можливості організму, запобігає хронізації та рецидивам.

Показання для застосування. Порушення менструального циклу, передменструальний синдром, болісні менструації, клімактеричні розлади, а також у комплексному лікуванні запальних гінекологічних захворювань.

Протипоказання. Вагітність та годування груддю.

Підвищена чутливість (алергія) до будь-якого компонента препарату.

Особливі застереження.

Лікарська форма таблетки містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції замість таблеток Ременс® потрібно застосовувати препарат у формі крапель.

Оскільки Ременс® містить рослинні природні компоненти, при зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку та кольору таблетки, що не призводить до зниження ефективності препарату.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Інформація щодо будь-якого ризику для плода та дитини від застосування препарату під час вагітності або годування груддю дотепер не зареєстрована.

Препарат не рекомендується застосовувати під час вагітності та в період годування груддю.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Препарат не впливає на здатність керувати транспортними та механічними засобами.
Діти. Препарат можна призначати дітям, починаючи зі статевого дозрівання.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі та підлітки: по 1 таблетці 2 рази на день.

Для прискорення одужання на початку лікування, а також у випадках, що потребують швидкого усунення симптомів, можливий прийом препарату кожні півгодини-годину до покращання стану, але не більше 4 разів на день, після чого приймати 2 рази на день.

Для досягнення максимального ефекту препарат Ременс® рекомендується приймати в проміжках між вживанням їжі (за 30 хв до або через годину після їди). Таблетку рекомендується тримати у роті до повного розсмоктування.

Тривалість прийому: 3 місяці, а при клімактеричному синдромі – не менше 6 місяців. При необхідності курс можна повторити.

Передозування. Випадки передозування не виявлені.

Побічні ефекти. У виняткових випадках, у осіб з гіперчутливістю на будь-який компонент препарату, можливі алергічні реакції; порушення зі сторони шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної системи.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Клінічно значуща взаємодія препарату Ременс® з іншими лікарськими засобами не встановлена. Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30 °С в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 12 таблеток у блістері; по 1 або 2, або 3, або 4 блістери в картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.