

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
АНГИЛЕКС-ЗДОРОВЬЕ
(Angilex-Zdorovyie)

Состав лекарственного средства:

действующие вещества: гексетидин, холина салицилат, хлорбутанола гемигидрат;

100 мл препарата содержат гексетидина в пересчете на 100% вещество 0,10 г, холина салицилата в пересчете на 100% вещество 0,50 г, хлорбутанола гемигидрата в пересчете на 100% вещество 0,25 г;

вспомогательные вещества: сахарин натрия, полисорбат, кислота пропионовая, этанол 96%, масло лимонное, масло анисовое, ментол, масло мяты перечной, эвкалипitol, метилсалицилат, вода очищенная.

Лекарственная форма. Спрей для ротовой полости.

Прозрачный, слегка окрашенный раствор со специфическим ароматным запахом.

Название и местонахождение производителя. ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье». Украина, 61013, г. Харьков, ул. Шевченко, 22.

Фармакотерапевтическая группа. Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Различные антисептики. Код АТС R02A A20.

Свойства препарата обусловлены действием трех его активных ингредиентов – гексетидина, холина салицилата, хлорбутанола.

Антибактериальное и противогрибковое действие обусловлено гексетидином, который проявляет антибактериальную активность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, как аэробов, так и анаэробов. В отношении аэробных микроорганизмов он оказывает, в основном, бактериостатическое влияние и слабое - бактерицидное. На анаэробные микроорганизмы гексетидин оказывает выраженный бактерицидный эффект. Механизм действия гексетидина основан на конкурентном замещении тиамин: структура гексетидина сходна со структурой тиамин, необходимого для роста микроорганизмов.

Противовоспалительное действие обусловлено холином салицилатом, который относится к группе нестероидных противовоспалительных средств и оказывает анальгезирующий, жаропонижающий и противовоспалительный эффект.

Обезболивающая активность обусловлена также местным анестетиком хлорбутанолом, который применяют в отоларингологии (капли в нос, полоскания) и в стоматологии (аппликации и орошения), в основном как болеутоляющее средство.

Активные вещества фиксируются на слизистой оболочке полости рта, откуда они постепенно высвобождаются.

Показания к применению. Местное лечение заболеваний и воспалительных процессов полости рта и глотки у взрослых и детей старше 2,5 лет:

гингивиты, стоматиты; пародонтиты;

афты и боль при прорезывании зубов;

послеоперационный уход за полостью рта;

ангины, острые и хронические тонзиллиты, фарингиты, ларингиты.

Противопоказания. Детский возраст до 2,5 лет. Выявленная аллергия к компонентам препарата.

Особые предостережения. Не рекомендуется длительное применение, поскольку это может привести к нарушению микробного равновесия в полости рта и горле.

Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат применяют только по назначению врача и только в том случае, если польза от применения препарата для матери превышает риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Применяют у детей в возрасте старше 2,5 лет. Безопасность применения препарата у детей младше 2,5 лет не исследована.

Способ применения и дозы. Применяют как местное средство для орошения полости рта.

Взрослым: 1 распыление 4–6 раз в сутки.

Детям в возрасте от 2,5 до 15 лет: 1 распыление 2–3 раза в сутки.

Курс лечения — не более 5 дней.

Передозировка. Сообщений о передозировке препарата не поступало.

Побочные реакции. Аллергические реакции: раздражение, кожные реакции. В этом случае лечение необходимо прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Не применять вместе с препаратами, содержащими антисептики.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. Флакон по 50 мл в коробке.

Категория отпуска. Без рецепта.