

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АТРИКАН 250
(ATRICAN 250)

Склад:

діюча речовина: тенонітрозол; 1 капсула містить тенонітрозолу 250 мг;

допоміжні речовини: олія арахісова, олія соєва гідрогенізована, лецитин, желатин, сорбіто-сорбітановий розчин (Anidrisorb 85/70[®]), гліцерин, гіпромелози фталат, дибутилфталат, титану діоксид (E 171), заліза оксид жовтий (E 172).

Лікарська форма. Капсули кишковорозчинні.

Фармакотерапевтична група. Антипротозойні препарати. Код P01A X08.

Клінічні характеристики.**Показання**

Урогенітальний трихомоніаз.

Протипоказання.

Гостра та хронічна печінкова недостатність; підвищена чутливість до компонентів препарату (або перехресна чутливість), вживання алкоголю.

Спосіб застосування та дози.

Препарат приймають внутрішньо.

Гострий трихомоніаз: по 1 капсулі вранці та ввечері під час прийому їжі протягом 4 діб. При хронічних торпідних процесах можливе проведення більш тривалої або комбінованої терапії.

Рекомендовано одночасне лікування статевого партнера, незалежно від наявності клінічних симптомів захворювання.

Побічні реакції.

Можливі загальна слабкість, диспепсичні явища (гіркота у роті, нудота, анорексія, відчуття переповнення шлунка, біль та дискомфорт у епігастрії), забарвлення сечі та слізної рідини в жовтий колір, прояви з боку шкіри (жовтушність шкіри, дерматит, кропив'янка, свербіж, гіперемія, папульозні висипи), головний біль, запаморочення, дерматит.

Передозування.

Специфічних симптомів отруєння не встановлено. Спеціального антидоту не існує. У випадку перевищення дози – симптоматична терапія.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не рекомендується застосовувати препарат вагітним жінкам (дані по потенційну тератогенність та ембріотоксичність у людини відсутні). При застосуванні препарату слід припинити годування груддю (препарат проникає в материнське молоко).

Діти.

Препарат Атрикан 250 не застосовують дітям.

Особливі заходи безпеки.

При наявності передвісників захворювань системи крові або у випадку повторного лікування рекомендується контролювати лейкоцитарну формулу. Не вживати алкоголь під час лікування.

Особливості застосування.

Лікування має бути одночасним для обох статевих партнерів. Оскільки тенонітрозол частково виділяється слюзовою рідиною, у період прийому препарату можливе забарвлення склер у жовтий колір. Тому під час лікування цим препаратом бажано не користуватися контактними лінзами, щоб уникнути їх забарвлення. Можлива також зміна кольору сечі. Ці ефекти зникають після припинення лікування і не завдають ніякої шкоди здоров'ю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Дані про несумісність препарату з іншими лікарськими засобами відсутні. Під час застосування препарату забороняється вживання алкоголю та лікарських засобів, які містять етиловий спирт.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Тенонітрозол - синтетична сполука, що має трихомонацидну дію відносно *Trichomonas vaginalis* та фунгістатичну відносно грибів роду *Candida*.

Фармакокінетика. Після прийому внутрішньо Атрикан добре абсорбується в кишечнику. Максимальна концентрація препарату у плазмі крові досягається протягом 2-3 годин; виведення з організму досить повільне, що забезпечує трихомонацидну концентрацію Атрикану (5 мкг/мл) в сироватці крові протягом не менше 5 годин після одноразового прийому 250 мг препарату. Період напіввиведення становить приблизно 5-6 годин. Протягом 8-14 годин препарат елімінується повністю. Атрикан має афінитет до сечостатевих шляхів.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: непрозора капсула діаметром 7,5 мм, овальної форми, жовтувато-гірчичного кольору, що містить гомогенну маслянисту масу.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати у місцях, недоступних для дітей, при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 8 капсул у блістері, у картонній упаковці.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. Завод Іннотера Шузі, Франція.
INNOTHERA CHOUZY, France

Місцезнаходження виробника.

Рю Рене Шантере «Л'Іль Вер» - 41150 Шузі сюр Сіс, Франція /
Rue Rene Chantereau «L' Isle Vert» - 41150 Chouzy sur Cisse-France.