

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
Фалімінт
(Falimint)

Загальна характеристика:

хімічна назва: N-ацетил-5-нітро-2-пропоксіанілін;

основні фізико-хімічні властивості: майже зовсім білі, опуклі з обох боків драже з гладкими поверхнями, однорідного вигляду.

склад: 1 драже містить ацетиламініонітропропоксибензену 25 мг;

допоміжні речовини: сахароза, желатин, жир затверділий, тальк, коповідон, кремнію діоксид високодисперсний, магнію стеарат, сироп глюкозний, симетикон, парафін рідкоплинний, парафін твердий.

Форма випуску. Драже.

Фармакотерапевтична група. Засоби, які застосовують при захворюваннях горла.

Код АТС R 02 A20.

Фармакологічні властивості. *Фармакодинаміка.* Властивості Фалімінта можна порівняти з властивостями ментолу. Він, як ментол, але значно більшою мірою, викликає приємне відчуття прохолоди в порожнині рота і горла. Фалімінт не спричинює підсушуючої дії на слизові оболонки та відчуття затерпlosti у роті. При розсмоктуванні драже миттєво відчувається охолоджуюча та освіжаюча дія, досягається полегшення дихання та припиняється розвиток рефлекторного кашлю будь-якого характеру. Фалімінт приводить до розрідження слизу, пом'якшення болю та справляє протизапальну дію. При лікарських маніпуляціях у порожнині рота і горла пригнічуються позиви на блювання.

Фармакокінетика. Перорального введення Фалімінт добре засвоюється. В плазмі крові виявляється тільки незмінений Фалімінт, максимальні значення якого досягаються вже через 0,5 - 1 годину після прийому. Фалімінт виводиться з організму із сечею у вигляді метаболітів. В різних дослідженнях метаболізму Фалімінту були виявлені 8 метаболітів, з яких 3-(2-ацетаміно-4-нітрокси)пропіонова кислота рахується основним. Метаболіти з редукованою нітрогрупою до цього часу не були виявлені.

Показання для застосування. Як допоміжний засіб при лікуванні захворювань порожнини рота і горла, при інструментальних обстеженнях порожнини рота і горла, при лікуванні зубів.

Спосіб застосування та дози. За відсутності інших рекомендацій приймають по одному драже декілька разів на день, повільно розсмоктуючи їх у порожнині рота, але не більше 10 драже на добу.

Побічна дія. Можливі алергічні реакції.

Протипоказання. У разі підвищеної чутливості до одного з компонентів цього лікарського засобу препарат Фалімінт® застосовувати не дозволяється.

Передозування. При передозуванні може спостерігатись блювання.

Особливості застосування. У зв'язку з відсутністю достатнього досвіду використання цього препарату під час вагітності та у період годування груддю застосовувати Фалімінт® протягом цього часу не рекомендується. Хворі на цукровий діабет повинні враховувати вміст цукру в препараті: 1 драже відповідає 0,03 хлібної одиниці. Досвід застосування препарату в педіатрії відсутній. Препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом і механічними засобами. Препарат не придатний для довготривалого використання!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Не відома.

Умови та термін зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С! Лікарський засіб зберігати у недоступному для дітей місці! Термін придатності – 5 років.

Умови відпуску. Без рецепта.

Упаковка. Блістер по 20 драже. В одній картонній коробочці знаходиться 1 блістер.

Виробник. БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП).

Адреса. Glienicker Weg 125 D-12489 Berlin, Germany.