

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПРОСТОЛ ЄВРО

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: Serenoa repens;

1 капсула містить плодів пальми повзучої екстракт 320 мг;

допоміжні речовини: желатин; гліцерин; сорбіту розчин, що не кристалізується; метилгідроксibenзоат, пропілгідроксibenзоат, титану діоксид, понсо 4R (E 124), заліза оксид чорний, заліза оксид жовтий, заліза оксид червоний, вода очищена.

Лікарська форма. Капсули.

Коричневого/червоного кольору, непрозора, м'яка желатинова капсула овальної форми, яка містить маслянисту рідину жовтого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

«Біодеал Лабораториз Пвт Лтд» на заводі «Софтгел Хелткер Пвт Лтд», Індія.

Survey No.20/1, Vandalur-Kelambakkam Road, Pudupakkam village, Kancheepuram District, Tamilnadu – 603103.

Фармакотерапевтична група. Препарати, які застосовуються при доброякісній гіпертрофії передміхурової залози. Код АТС G04C X02.

Препарат пригнічує ферменти 5 α -редуктазу та ароматазу.

5 α -редуктаза каталізує перетворення тестостерону в дигідротестостерон; ароматаза сприяє перетворенню тестостерону у 17 β -естрадіол. У патогенезі гіперплазії передміхурової залози основну роль приписують дигідротестостерону та естрогенам. Екстракт плодів пальми повзучої інгібує стимульований дегідротестостероном і естрадіолом ріст тканин передміхурової залози.

Екстракт з плодів пальми повзучої має антиексудативні та протинабрякові властивості.

Показання для застосування. Порушення сечовипускання при доброякісній гіперплазії передміхурової залози I і II стадій за Алькеном (Alken).

Протипоказання. Підвищена чутливість до екстракту плодів пальми повзучої або до будь-якого з компонентів препарату.

Особливі застереження. Перед застосуванням препарату слід переконатися у тому, що захворювання носить доброякісний характер. Цей препарат лише полегшує нездужання, спричинене збільшенням простати, але не усуває її збільшення. Тому рекомендується консультація лікаря щодо необхідності здійснення системного контрольного обстеження, особливо за наявності крові в сечі або в разі гострої затримки сечі.

- *Застосування у період вагітності або годування груддю.* Не застосовують.

- *Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не впливає.

- *Діти.* Не призначають дітям.

Спосіб застосування та дози. Приймають по одній капсулі 1 раз на день, не розжовуючи, з невеликою кількістю рідини. Максимальна добова доза – 320 мг.

Тривалість застосування визначається індивідуально.

Передозування. Про будь-які випадки передозування не повідомлялося.

Побічні ефекти. Рідко - нудота, печія, гастралгія (при прийомі ліків натщесерце), можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Клінічно значима взаємодія відсутня.

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

Упаковка. По 10 капсул у блістері. По 3 блістери вкладають у коробку з картону.

Категорія відпуску. Без рецепта.