

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

СПРЕЙ КСІНОС

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: xylomethazoline;

1 мл розчину містить ксилометазоліну гідрохлориду 1 мг;

допоміжні речовини: натрію дигідрофосфат, натрію гідрофосфат, натрію хлорид, бензалконію хлорид, вода очищена.

Лікарська форма. Спрей назальний.

Прозорий, безбарвний розчин.

Назва і місцезнаходження виробника.

Данафа Фармасьютікал Джойнт Сток Компані.

б. 253, вул. Зунг Сі Тхань Тхе, м. Дананг Сіті, В'єтнам.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Код АТС R01A A07.

Ксилометазолін є симпатоміметичним агентом, що діє на α -адренергічні рецептори.

СПРЕЙ КСІНОС звужують назальні кровоносні судини, зменшуючи набряк слизової оболонки носа, його придаткових пазух, поліпшуючи тим самим носове дихання при закладеності носа та придаткових пазух.

Дія препарату починається через декілька хвилин після застосування та зберігається до 12 годин.

Препарат добре переноситься, в тому числі у хворих з чутливою слизовою оболонкою. Препарат не знижує мукоциліарну функцію. Препарат має збалансоване значення рН у межах, властивих носовій порожнині.

При місцевому застосуванні практично не абсорбується, концентрації ксилометазоліну у плазмі настільки малі, що їх неможливо визначити сучасними аналітичними методами.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування закладеності носа при застуді, інших алергічних ринітах, синуситах.

Для полегшення відтоку секрету при захворюваннях придаткових пазух носа.

Допоміжна терапія у випадках середнього отиту (для усунення набряку слизової оболонки).

Для полегшення проведення риноскопії.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. Глаукома, артеріальна гіпертензія, тахікардія, атрофічний риніт, трансфеноїдальна гіпофізектомія та хірургічні втручання з оголюванням мозкової оболонки в анамнезі. Період вагітності. Дитячий вік до 6 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не слід застосовувати більше 10 днів поспіль. Тривале лікування препаратом може спричинити зворотний ефект.

Препарат слід з обережністю призначати пацієнтам, які при застосуванні адренергічних препаратів мають сильні реакції, які виявляються у вигляді безсоння, запаморочення, тремтіння, серцевої аритмії, підвищення артеріального тиску.

Не слід перевищувати рекомендовану дозу препарату, особливо при лікуванні дітей та осіб літнього

віку.

Слід з обережністю призначати препарат пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, закритокутовою глаукомою, хворим на цукровий діабет, із захворюваннями щитовидної залози.

Не рекомендується часте і тривале застосування при хронічних захворюваннях порожнини носа та навколоносових пазух.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат не можна приймати в період вагітності через судинозвужувальний вплив.

Немає доказів проявів побічної дії у немовлят, які отримують материнське молоко. Не відомо чи виділяється ксилометазолін у грудне молоко, тому жінкам, які годують груддю, можна застосовувати препарат тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для дитини (за рекомендацією лікаря).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат застосовують дітям старше 6 років за рекомендацією лікаря.

Спосіб застосування та дози.

Перед введенням препарату слід ретельно прочистити ніс.

Дорослі та діти старше 6 років

По 1 впорскуванню (відповідає 0,14 мг ксилометазоліну на одне впорскування) в кожний носовий хід 3 - 4 рази на добу.

Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання і не повинна перевищувати 10 днів поспіль.

Передозування.

Рідко відмічалось передозування препарату дітьми, клінічна картина характеризувалася, головним чином, прискореним і нерегулярним пульсом, підвищенням артеріального тиску, у поодиноких випадках – втратою свідомості.

Лікування: припинення застосування препарату. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Зазвичай препарат добре переноситься.

Іноді можливі такі небажані ефекти, як відчуття печіння у носі або горлі, місцеве подразнення або сухість слизової оболонки носа, нудота, головний біль, сонливість, слабкість, тахікардія.

Рідко спостерігались системні алергічні реакції, тимчасове порушення зору і прискорене серцебиття.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Можливо збільшення системного ефекту ксилометазоліну при одночасному прийомі з трициклічними або тетрациклічними антидепресантами, інгібіторами моноаміноксидази, особливо при передозуванні.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Сторінка 3 з 3. Видаєник: Державний експертний центр МОЗ України

Після відкриття флакона препарат слід застосовувати протягом 21 дня.

Упаковка.

По 15 мл у пластиковому флаконі з помповим дозуючим розпилювачем; по 1 флакону в картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.