

## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

### Персен Кардіо

#### Склад лікарського засобу:

*діючі речовини:* 1 капсула містить сухого екстракту трави пасифлори (5 - 7:1) еквівалентно 200 мг нативного екстракту та сухого екстракту листя і квіток глоду (4 - 7:1) еквівалентно 160 мг нативного екстракту;

*допоміжні речовини:* лактози моногідрат, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію оксид, магнію стеарат;

*желатинова капсула:* титану діоксид (E171), заліза оксид жовтий та червоний (E172), гіпромелоза.

#### Лікарська форма. Капсули.

Капсули з коричнево-червоною кришечкою і світло-коричневим корпусом, що містять коричневий з вкрапленнями порошок або спресований порошок.

#### Назва і місцезнаходження виробника.

Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз.  
1526 Любляна, Веровшкова, 57, Словенія.

#### Фармакотерапевтична група.

Інші седативні та снодійні лікарські засоби. Код АТС N05C M.

Інші кардіологічні засоби. Код АТС C01E B.

*Персен Кардіо є препаратом рослинного походження з м якою седативною дією.*

Препарат містить сухі екстракти трави пасифлори і листя та квіток глоду.

Препарати, що містять траву пасифлори, застосовуються при тимчасових розумових перевантаженнях, збудженому стані і безсонні.

Екстракт листя і квіток глоду підвищує серцеву провідність, покращує коронарний кровотік і судинний кровообіг, запобігає серцевій аритмії і помірно знижує артеріальний тиск.

Ефективність комбінації цих рослин базується на їх традиційному застосуванні. Ефекти лікарських рослин взаємно доповнюються. Комбінація виявляє помірну седативну і кардіотонічну активність.

#### Показання для застосування.

Підвищена нервова збудливість, вегето-судинна дистонія, функціональні порушення серцевої діяльності, невроз. Тимчасові розумові перевантаження, роздратованість і пов'язані зі стресом серцеві навантаження для підтримки функцій серця і кровообігу.

#### Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Період вагітності і годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

#### Належні заходи безпеки при застосуванні.

Якщо під час лікування спостерігаються набряки на ногах, задишка, біль у ділянці серця, що розповсюджується на руки, черевну порожнину або на ділянки біля шиї, та коли симптоми не змінюються протягом 6 тижнів, слід вжити відповідних заходів.

Інструкцію завантажено з сайту [www.dovgolit.com](http://www.dovgolit.com)

Препарат містить лактозу, тому його не слід застосовувати пацієнтам з рідкісними спадковими проблемами непереносимості галактози, дефіцитом лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції.

### **Особливі застереження.**

#### ***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Безпека застосування препарату в період вагітності і годування груддю не встановлена, тому не слід застосовувати Персен Кардіо у ці періоди.

#### ***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.***

Препарат містить екстракт трави пасифлори, тому пацієнтам, які лікуються Персен Кардіо, слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи зі складними механізмами протягом 2 годин після прийому препарату.

#### ***Діти.***

Ефективність і безпека застосування препарату дітьми до 12 років не встановлені, тому його застосування цій категорії пацієнтів не рекомендується.

### **Спосіб застосування та дози.**

#### ***Дорослі і діти старше 12 років.***

Рекомендована доза – 1 капсула на добу. За необхідності дозу можна підвищити до 1 капсули двічі на добу. Максимальна добова доза – 2 капсули.

Капсули слід приймати до їди, запиваючи рідиною.

Для досягнення терапевтичного ефекту препарат необхідно приймати не менше 6 тижнів. Якщо після 6 тижнів лікування стан хворого погіршився або не покращився, необхідно звернутися до лікаря.

### **Передозування.**

Невідоме. Можливі прояви гіперчутливості, що потребує десенсибілізуючої терапії.

### **Побічні ефекти.**

*Порушення з боку травного тракту:* дуже рідко – нудота, блювання, біль у черевній порожнині.

*Алергічні реакції:* дуже рідко – свербіж, висипи.

У поодиноких випадках можливе виникнення сонливості.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Дослідження взаємодії Персен Кардіо з іншими лікарськими засобами не проводились. Перед застосуванням будь-якого іншого лікарського засобу пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем.

Оскільки не можна повністю виключити взаємодію з препаратами для лікування серцево-судинних захворювань, не рекомендується їх одночасне застосування.

При прийомі з іншими седативними, нейротропними, серцево-судинними засобами із заспокійливим типом дії можливе пригнічення центральної нервової системи.

### **Термін придатності.**

2 роки.

### **Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

### **Упаковка.**

Інструкцію завантажено з сайту [www.dovgolit.com](http://www.dovgolit.com)

ЗАТВЕРДЖЕНО                      Сторінка 3 з 3. Видаєник: Державний експертний центр МОЗ України  
По 8 капсул у блістері; по 2 (2    8) блістери в картонній коробці.

**Категорія відпуску.**  
Без рецепта.