

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ФІТОУРОЛІТ
(FHYTOUROLYTE)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 100 мл настойки містять біологічно активних речовин із ромашки квіток 3 г, хвою польового трави 3 г, вовчуга коренів 3 г, берези листя 3 г, марени красильної кореневищ і коренів 3 г, ортосифону листя 3 г, кропу запашного плодів 2 г;
допоміжна речовина: етанол (70 %).

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина від коричневого до червоно-коричневого кольору, зі специфічним запахом. При зберіганні допускається наявність осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

Комунальне підприємство “Луганська обласна “Фармація”, Фармацевтична фабрика.
Україна, 91020, м. Луганськ, Степовий тупик, 2.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються в урології. Код АТС G04B X50.

Комбінований засіб рослинного походження, що сприяє виведенню сечових конкрементів. Дія препарату зумовлена властивостями компонентів, що входять до складу препарату. Фітоуроліт чинить протизапальну, спазмолітичну, діуретичну, антисептичну дію, регулює мінеральний обмін, нормалізує фізико-хімічні показники сечі, призводить до відновлення оптимальної уродинаміки, зменшує лейкоцитурію. Під впливом препарату посилюється виділення солей сечової кислоти та підвищується рН сечі, що попереджує утворення і ріст конкрементів у сечових шляхах.

Показання для застосування.

Лікування та профілактика сечокам'яної хвороби з наявністю у нирках та сечоводах первинних та рецидивуючих конкрементів, ускладнення, спричинені проходженням фрагментів каменів після ударно-хвильової літотрипсії, сечо- та шавлевокислий діатез, гострий та хронічний калькульозний пієлонефрит.
Профілактика після оперативного видалення і/або самостійного відходження конкрементів.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату, період вагітності та годування груддю, дитячий вік до 12 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат містить спирт. Не рекомендується застосування препарату протягом тривалого часу.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовують.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Слід дотримуватися обережності при прийманні лікарського засобу, оскільки він впливає на здатність керувати автомобілем та працювати з іншими механізмами.

Діти.

Не застосовують у дітей віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Фітоуроліт призначають внутрішньо дорослим та дітям старше 12 років по 15 – 20 крапель 2 – 3 рази на добу за 30 хв до їди. Курс лікування визначає лікар індивідуально, зазвичай середня тривалість курсу становить 3 – 4 тижні. За необхідності можливе проведення повторних курсів лікування, що визначає лікар індивідуально.

Передозування.

Не відоме.

Побічні ефекти.

Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння шкіри, свербіж, висипання на шкірі).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не відома.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

При зберіганні допускається випадіння осаду.

Упаковка.

По 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.