

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КАПСІОЛ

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 мл препарату містить кислоти саліцилової 10 мг, олії рицинової 100 мг, перцю стручкового настойки (1:10) 0,1 мл;

допоміжна речовина: етанол 96 %.

Лікарська форма.

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Прозора рідина від червонувато-жовтого, жовтого до жовтуватого кольору зі специфічним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ "Фітофарм".

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Дерматологічні препарати.

Код АТС D11A X20**.

Препарат чинить місцеву подразнювальну, пом'якшувальну та кератолітичну дію, що сприяє поліпшенню живлення і росту волосся. Саліцилова кислота, яка входить до складу препарату, чинить антисептичну дію, що разом з пом'якшувальним ефектом рицинової олії забезпечує видалення лупи. Настойка перцю стручкового проникає у волосяні мішечки і подразнює цибулини волосся, стимулюючи їх ріст.

Показання для застосування.

видалення та запобігання появи лупи.

Профілактика і лікування випадіння волосся,

Протипоказання.

підвищена чутливість шкіри до компонентів препарату.

Захворювання шкіри різноманітного характеру,

Особливі застереження.

Не слід наносити препарат на місця з гострим запальним процесом шкіри або її uszkodженням.

Запобігати потраплянню препарату в очі. У разі потрапляння в очі слід ретельно промити їх великою кількістю проточної води.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування препарату під час вагітності протипоказано. За необхідності лікування Капсіолом годування груддю потрібно припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не відомо.

Діти. Не застосовувати дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Частіше 1 разу на тиждень. Курс лікування становить 1-2 місяці. Через 3-4 тижні курс лікування необхідно повторити.

Препарат втирають у шкіру голови на 1 годину до миття волосся, як правило, не

Передозування.

кератолітична дія та алергічні реакції. Терапія симптоматична.

При застосуванні великих доз препарату може посилюватися

Побічні ефекти.

Побічні реакції препарату, обумовлені саліциловою кислотою: сухість, лущення, подразнення шкіри, контактний дерматит, кропив'янка, свербіж, що потребує відміни препарату.

При тривалому застосуванні можливе всмоктування препарату в системний кровообіг і розвиток характерних для саліцилатів побічних ефектів: шум у вухах, запаморочення, біль в епігастрії, нудота, блювання, ацидоз, тахіпное.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Місцеве застосування препаратів, що містять саліцилову кислоту, не слід поєднувати з пероральним застосуванням препаратів, які містять ацетилсаліцилову кислоту та інші нестероїдні протизапальні засоби. Не застосовувати разом з бензоїлпероксидом і місцевими препаратами ретиноїдів. Саліцилова кислота може підвищити проникність шкіри для інших лікарських засобів. Може посилити небажану дію метотрексату, гіпоглікемічну дію пероральних протидіабетичних препаратів, похідних сульфонілсечовини.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Упаковка.

По 100 мл у флаконах і пачках.

Категорія відпуску.

Без рецепта.