

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

КОЛІКІД

Склад:

діюча речовина: simeticone;

1 таблетка містить симетикону 125 мг;

допоміжні речовини: магнію алюмінію силікат; лактози моногідрат; целюлоза мікрокристалічна; кальцію гідрофосфат; кислота стеаринова; кремнію діоксид колоїдний безводний; кросповідон; повідон К29/32; покриття Opadry II 85G 52218 Yellow.

Лікарська форма. Таблетки, вкриті оболонкою.

Фізико-хімічні властивості: Овальні, гладкі з обох сторін таблетки, вкриті оболонкою жовтого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД.

СП 289 (А), РІККО Індл. Ареа Чопанкі, Бхіваді (Радж.), Індія.

Фармакотерапевтична група.

Інші препарати для лікування функціональних розладів кишечника. Силікони.

Код АТС А03А Х13.

Фармакологічні властивості.

Колікід – це препарат, що зменшує газоутворення в кишечнику. Активний компонент препарату – симетикон – інертна поверхнево-активна речовина, яка усуває пухирці газу в кишечнику при метеоризмі, зменшуючи їх поверхневий натяг. Гази, що вивільнюються при цьому, можуть як поглинатись стінками кишечника, так і виводитись із організму, завдяки перистальтиці кишечника. Симетикон не абсорбується в травному каналі, виводиться транзитом. Прийняття Колікід до початку діагностичних досліджень попереджає виникнення дефектів зображення, що викликаються пухирцями газу; сприяє ретельному зрошенню слизової оболонки товстої кишки контрастною речовиною, що запобігає розриву контрастної плівки навіть в разі здуття кишечника.

Колікід не має центральної дії.

Показання для застосування.

Симптоматичне лікування метеоризму (в том числі в післяопераційному періоді); використовується як допоміжний засіб для підготовки до діагностичного дослідження органів черевної порожнини (рентгенологічне дослідження, УЗД, гастроскопія та інше); як піногасник при інтоксикації поверхнево-активними речовинами (засоби для прання).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до препарату та його компонентів.

Кишкова непрохідність, обструктивні захворювання ШКТ.

Особливі застереження.

-Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає даних щодо ймовірної екскреції препарату в грудне молоко. Застосування Колікід у період вагітності та лактації можливе тільки за рекомендацією лікаря.

-Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з

іншими механізмами.

Колікід не впливає на розумову активність, здатність керувати автомобілем та працювати з іншими механізмами.

-Діти

Колікід таблетки застосовують у дітей віком від 12 років. Дітям до 12 років назначають препарат у вигляді рідких лікарських форм.

Спосіб застосування та дози.

При метеоризмі дітям від 12 років та дорослим призначають по 1 таблетці 3–5 разів на добу. З метою підготовки до діагностичних досліджень призначають по 1 таблетці 3 рази на добу за день до дослідження і ще 1 таблетку – вранці в день його проведення. Колікід приймають під час або після їжі. Тривалість курсу лікування встановлюється індивідуально. За потреби препарат можна приймати тривалий час.

Передозування.

Не відоме.

Побічні ефекти.

Алергічні прояви при підвищеній чутливості до препарату та його компонентів.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлена.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 7 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній упаковці № 14 (7 + 2).

Категорія відпуску.

Без рецепта.