

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

КОЛІКІД

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 мл суспензії містить симетикон емульсію еквівалентно симетикону 40 мг;

допоміжні речовини: полісорбат 80, карбомер, сахарин натрію, гліцерин, натрію бензоат (Е 211), смакова добавка м'ята перцева, смакова добавка солодкий ананас, натрію гідроксид, вода очищена.

Лікарська форма. Суспензія оральна.

Суспензія білого кольору з характерним запахом.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «КУСУМ ФАРМ».

Україна, 40030, м. Суми, вул. Скрябіна, 54.

Фармакотерапевтична група.

Препарати для лікування функціональних розладів кишечника. Силікони.

Код АТС А03А Х13.

Колікід – це препарат, що зменшує прояви метеоризму. Активний компонент препарату – симетикон – інертна поверхнево-активна речовина, яка усуває пухирці газу в кишечнику при метеоризмі, зменшуючи їх поверхневий натяг. Газу, що вивільняються при цьому, можуть як поглинатися стінками кишечника, так і виводитися з організму завдяки перистальтиці кишечника. Симетикон не абсорбується в травному каналі, виводиться транзитом, тому Колікід не чинить центральної дії.

Застосування препарату до початку діагностичних досліджень попереджає виникнення дефектів зображення, що спричиняються пухирцями газу; сприяє ретельному зрошенню слизової оболонки товстої кишки контрастною речовиною, що запобігає розриву контрастної плівки навіть у разі здуття кишечника.

Фармакокінетичні дані не представлені, оскільки симетикон не всмоктується з травного тракту. Виводиться з організму у незміненому вигляді.

Показання для застосування.

- Симптоматичне лікування при скаргах з боку шлунково-кишкового тракту, пов'язаних з газоутворенням (наприклад, метеоризм);
- як допоміжний засіб при проведенні діагностичних досліджень органів черевної порожнини (рентгенографія, ультразвукове дослідження) та підготовка до гастродуоденоскопії;
- посилене газоутворення після хірургічних втручань;
- отруєння миючими засобами.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до препарату та його компонентів.

Непрохідність кишечника, обструктивні захворювання травного тракту.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застережень немає.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат застосовують дітям від дня народження.

Спосіб застосування та дози.

Препарат приймають під час або після вживання їжі, а за необхідності – перед сном.

Тривалість лікування залежить від наявності скарг. За необхідності препарат можна приймати протягом тривалого часу. Перед застосуванням вміст флакона треба добре збовтати.

Скарги з боку травного тракту, пов'язані з газоутворенням.

Немовлята: 0,5 - 1 мл Колікиду додають у пляшечку з дитячим харчуванням при кожному годуванні або дають до/після годування груддю за допомогою маленької ложки.

Якщо необхідно, дозу можна збільшити до 40 мг (1 мл). Зникнення симптомів спостерігається через декілька днів.

Діти віком від 1 до 6 років: по 1 мл препарату; *від 6 до 14 років:* по 1 - 2 мл препарату; *діти старше 14 років і дорослі:* по 2 мл препарату.

Препарат застосовують під час або після вживання їжі кожні 4 - 6 годин.

Для вимірювання доз можна використовувати пластиковий разовий шприц без голки ємністю 2 мл.

При отруєнні миючими засобами. Залежно від тяжкості отруєння діти приймають від 2,5 мл до 10 мл Колікиду, а дорослі – від 10 до 20 мл препарату.

Для підготовки до діагностичних досліджень. Дітям – 3 рази на добу, по 1 мл суспензії Колікиду за добу до дослідження та 1 мл суспензії вранці перед проведенням дослідження.

Дорослим – 3 рази на добу, по 2 мл суспензії Колікиду за добу до дослідження та 2 мл суспензії вранці перед проведенням дослідження.

Передозування.

Передозування малоімовірно, оскільки препарат хімічно та фізіологічно інертний.

Побічні ефекти.

Оскільки симетикон не всмоктується у шлунково-кишковому тракті і виводиться з організму у незміненому стані, небажані ефекти препарату малоімовірні. У поодиноких випадках можливе виникнення шкірних алергічних реакцій.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Відомості відсутні.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °С в захищеному від світла місці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Після першого відкриття флакона препарат зберігати не більше 4 тижнів.

Упаковка.

По 30 мл або 60 мл суспензії у флаконі. Кожний флакон у картонній коробці з мірною ложкою.

Категорія відпуску.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

ЗАТВЕРДЖЕНО
Без рецепта.

Сторінка 3 з 3. Видаєник: Державний експертний центр МОЗ України