

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ВАЛІДОЛ– ЗДОРОВ'Я

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 таблетка містить розчину ментолу у ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової (ментолу 15,6 мг, ментилового ефіру кислоти ізовалеріанової 44,4 мг) 60 мг;

допоміжні речовини: цукор-пісок, кремнію діоксид колоїдний безводний, кальцію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.

Таблетки плоскоциліндричної форми з фаскою та рискою, білого або жовтувато-білого кольору, з характерним запахом ментолу. На поверхні таблеток допускаються сірі крапління та наліт порошку цукрової пудри.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22.

Фармакотерапевтична група.

Комбіновані кардіологічні препарати. Код АТС С01Е Х.

Препарат чинить заспокійливу дію на центральну нервову систему, а також спричиняє помірний рефлекторний судинорозширювальний (коронаролітичний) вплив шляхом рефлекторного подразнення чутливих нервових («холодових») рецепторів слизової оболонки ротової порожнини. Стимуляція рецепторів супроводжується індукцією вивільнення ендорфінів, енкефалінів, динорфінів та інших опіїдних пептидів, що відіграють важливу роль у зменшенні больового відчуття, нормалізації проникності судин і регуляції інших важливих механізмів функціонування серцево-судинної та нервової систем. Під впливом препарату вивільнюються фізіологічно активні сполуки – гістамін, кініні тощо.

При сублінгвальному застосуванні препарат абсорбується зі слизової оболонки ротової порожнини. Терапевтичний ефект настає приблизно через 5 хв.

Після всмоктування біотрансформується в печінці і видаляється з сечею у вигляді глюкуронідів.

Показання для застосування.

Напади стенокардії легкого ступеня тяжкості; морська та повітряна хвороби; істерія; невроз; головний біль, пов'язаний із прийомом нітратів.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Виражена артеріальна гіпотензія; гострий інфаркт міокарда. Дитячий вік.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат містить цукор, що слід враховувати хворим на цукровий діабет.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе, якщо, на думку лікаря, очікуваний позитивний ефект для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Необхідна обережність у перші години після прийому препарату при керуванні транспортними засобами або роботі, що вимагає підвищеної уваги, через можливі побічні ефекти (запаморочення та сонливість).

Діти.

Досвіду застосування препарату для лікування дітей немає, тому не слід призначати препарат цій віковій категорії пацієнтів.

Спосіб застосування та дози.

Таблетки тримають у роті (під язиком) до повного розсмоктування.

Разова доза для дорослих становить 1 - 2 таблетки; добова доза – 2 - 4 таблетки.

При необхідності добову дозу можна збільшити. Максимальна добова доза – 600 мг.

Тривалість лікування – до 7 днів.

Передозування.

Симптоми: головний біль, нудота, збудження, порушення діяльності серця, зниження артеріального тиску, пригнічення центральної нервової системи, реакції гіперчутливості до компонентів препарату (ангіоневротичний набряк, кропив'янка, свербіж, висипання).

Лікування: відміна препарату, промивання шлунка та симптоматична терапія.

Побічні ефекти.

При тривалому прийомі зрідка можуть спостерігатися легка нудота, дискомфорт у животі, слезотеча, запаморочення, короткочасна артеріальна гіпотензія, сонливість, які швидко минають самостійно.

Можливий розвиток алергічних реакцій, в тому числі набряк Квінке, висипання, свербіж, кропив'янка.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Валідол-Здоров'я посилює седативний ефект психотропних засобів, опіюйдних анагетиків, алкоголю та засобів для наркозу.

Можливе потенціювання дії антигіпертензивних препаратів при одночасному їх застосуванні з Валидолом-Здоров'я.

Валідол-Здоров'я зменшує виразність головного болю, обумовленого прийомом нітратів.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 таблеток у блістері.

Категорія відпуску.

Без рецепта.