

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
РЕВМА-ХЕЕЛЬ
(RHEUMA-HEEL®)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 таблетка містить: Rhus toxicodendron D6 – 60 мг, Bryonia D4 – 60 мг, Causticum Hahnemannii D4 – 60 мг, Arnica montana D4 – 60 мг, Ferrum phosphoricum D6 – 60 мг;

допоміжні речовини: магнію стеарат, лактоза моногідрат.

Лікарська форма. Таблетки.

Круглі, плоскі з фаскою, від білого до жовто-білого кольору, без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевеш-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Показання для застосування. Ревматичні захворювання м'яких тканин; (пері)артритні розлади.

Протипоказання. Підвищена чутливість до суміші отруйного та будь-якого компонента препарату.

Особливі застереження.

Препарат містить лактозу, тому пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не можна застосовувати препарат.

Застосування в період вагітності або годування груддю. Через недостатність належного задокументованого досвіду застосування препарат може застосовуватись під час вагітності та годування груддю лише після консультації з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Невідома.

Діти. Через недостатність належного задокументованого досвіду застосування препарату у дітей, даний лікарський засіб не рекомендовано застосовувати у цій віковій категорії.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим – 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування).

Приймати 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після їди.

Курс лікування – 2 - 4 тижні.

Передозування.

Не відзначалось.

Побічні ефекти.

У поодиноких випадках можуть виникати шлунково-кишкові або шкірні реакції – в тому числі через кілька днів після застосування препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Закривати контейнер з таблетками негайно після застосування, захищати від вологи.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Поліпропіленовий контейнер на 50 таблеток у картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.