

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СПИРТ КАМФОРНИЙ

Склад лікарського засобу:

Склад на 100 мл розчину:

діюча речовина: камфора рацемічна – 10 г*допоміжна речовина:* 70% етанол – до 100 мл

Лікарська форма. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10 %.
Прозора безбарвна рідина із специфічним запахом камфори.

Назва і місцезнаходження виробника.

ДП «Агрофірма «Ян», ПП «Ян».

Україна, Житомирська обл., Ружинський район, с. Немиринці, вул. Леніна, 41.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТС M02A X10.

Препарат чинить протимікробну, знеболювальну, протизапальну, подразнювальну дію.

Показання для застосування.

Зовнішньо – при запальних процесах (артрит, міозит, артралгія, міалгія, ішіас), для запобігання пролежням.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість. Виразково-некротичні захворювання шкіри, схильність до судомних реакцій.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

Не допускати потрапляння препарату на слизові оболонки. При випадковому потрапленні слід змити препарат великою кількістю проточної води.

Особливі застереження.*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Не застосовують дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Камфорний спирт застосовують у дорослих зовнішньо для розтирань при наведених патологічних процесах. Розтирають шкіру 2 - 3 рази на добу.

Тривалість лікування визначається індивідуально.

Передозування.

Посилення побічних реакцій. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Можливі прояви алергічних реакцій, висипи, кропив'янка, подразнення шкіри, головний біль, запаморочення.

*У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не виявлена.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 15 °С в захищеному від світла, недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 40 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.