

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**СПИРТ МУРАШИНИЙ**

**Склад лікарського засобу:**

Склад на 100 мл розчину:

*діюча речовина:* мурашина кислота – 1,4 г;*допоміжна речовина:* 70 % етанол – 98,6 г.**Лікарська форма.** Розчин на шкірний спиртовий.

Прозора, безбарвна рідина із специфічним різким запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ДП "Агрофірма "Ян", ПП "Ян".

Україна, Житомирська обл., Ружинський район, с. Немиринці, вул. Леніна, 41.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТС M02A X10.

Спирт мурашиний відноситься до засобів, що подразнюють чутливі нервові закінчення. Внаслідок стимуляції рецепторів шкіри і підшкірних тканин препарат виявляє не тільки рефлекторний, а й загальний гуморальний вплив. Подразнення Спиртом мурашиним рецепторів супроводжується стимуляцією утворення і вивільнення ендорфінів, динорфінів, пептидів, що відіграють важливу роль в регуляції больових відчуттів, проникності судин та інших процесів.

**Показання для застосування.**

Невралгії, міозити, артралгії.

**Противоказання.**

Підвищена чутливість до препарату. Екземи, запальні та інфекційні захворювання шкіри, локалізовані в ділянці його застосування, а також алергічні захворювання.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Запобігати потраплянню препарату на слизові оболонки та в очі.

**Особливі застереження.****Застосування у період вагітності або годування груддю.**

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

**Діти.**

Не застосовують дітям віком до 12 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Спирт мурашиний застосовують зовнішньо для розтирання ураженої ділянки тіла. Кратність застосування препарату і тривалість курсу визначаються характером і вираженістю захворювання.

**Передозування.**

Не спостерігалось.

**Побічні ефекти.**

Можливі сильне подразнення шкіри, висипи, утворення пухирів.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні з препаратами, що містять органічні сполуки, можуть утворюватися нові сполуки, денатурація білкових компонентів.

**Термін придатності.**

3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 15 °С в захищеному від світла, недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 40 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.