

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ФОРМІДРОН**

**Склад лікарського засобу:**

Склад на 100 мл розчину:

*діючі речовини:*

розчин формальдегіду – 35% - 10 г;

96% етанол – 39,5 г

*допоміжні речовини:*

одеколон – 0,5 г;

вода очищена. – до 100 мл

**Лікарська форма.** Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Прозора, безбарвна рідина з ароматним запахом.

Прозора, безбарвна рідина з ароматним запахом.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ДП "Агрофірма "Ян", ПП "Ян".

Україна, Житомирська обл., Ружинський район, с. Немиринці, вул. Леніна, 41.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються при гіпергідрозі.

Код АТС D11A A.

Препарат чинить дезінфікуючу та дезодоруючу дію.

**Показання для застосування.**

Формідрон застосовують для обробки шкіри при підвищеній пітливості.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Захворювання шкіри. Дитячий вік до 14 років.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

З обережністю призначається хворим літнього віку та в період вагітності. Не наносити на обличчя з метою запобігання подразненню. Не допускати потрапляння в очі та на слизові оболонки.

**Особливі застереження.**

Різка почервоніння і свербіж шкіри після нанесення препарату свідчать про індивідуальну підвищену чутливість до останнього і вимагають негайного припинення застосування препарату.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не впливає.

**Діти.**

Не застосовується у дітей віком до 14 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовують зовнішньо. Дорослі та діти старше 14 років протирають шкіру ватним тампоном, змоченим препаратом, 1 - 2 рази на добу.

**Передозування.**

Не слід допускати передозування препаратом. При тривалому та частому застосуванні у разі почервоніння, свербіжу, подразнення, що є ознаками передозування, необхідно припинити лікування препаратом. Препарат змити водою зі шкірних покривів. Терапія симптоматична.

**Побічні ефекти.**

Подразнення шкіри, алергічні реакції, відчуття свербіжу.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не описана.

**Термін придатності.**

3 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 15 °С в захищеному від світла, недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 50 мл та 100 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.