

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

КЕЛТИКАН
(KELTICAN)

клад.*іючі речовини:*

капсула містить цитидину-5'-динатрію монофосфату 5,0 мг; уридину-5'-тринатрію трифосфату, идину-5'-динатрію дифосфату, уридину-5'-динатрію монофосфату – сумарно 3,0 мг квівалентно 1, 330 мг уридину);

томіжні речовини: кислота лимонна моногідрат, натрію цитрат, магнію стеарат, кремнію оксид колоїдний безводний, маніт (E 421);

олонка капсул: заліза оксид (E 172), титану діоксид (E 171), желатин, індигокармін (E 132).

ікарська форма. Капсули тверді.

армакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при захворюваннях нервової істеми. Код АТС N07X X.

лінічні характеристики.

оказання. Лікування невротатій кістково-суглобового (ішіас, радикуліт), метаболічного іабетична, алкогольна полінейропатія), інфекційного (оперізувальний лишай) походження, а кож запалення лицьового нерва, трійчастого нерва, міжреберної невралгії та люмбалгії.

ротипоказання.

ідвищена чутливість до компонентів препарату.

осіб застосування та дози.

репарат застосовують перорально, незалежно від прийому їжі.

комендована доза становить: для дорослих – 1 капсула 3 рази на добу.

обічні реакції. Не описані.

ередозування. З урахуванням низької токсичності препарату вірогідність отруєння дуже низька віть при випадковому перевищенні дози.
випадку передозування – симптоматичне лікування.

стосування у період вагітності або годування груддю. Препарат під час вагітності і в період дудування груддю застосовують після ретельної оцінки користь/ризик, оскільки немає інформації одо безпеки застосування препарату у вагітних жінок та в період годування груддю.

іти. Препарат не застосовують у дітей.

собливості застосування. Пацієнтам з порушеннями функції нирок або розладами травного акту рекомендується застосовувати Келтікан під час прийому їжі.

датність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з шими механізмами. Келтікан не впливає на здатність управляти транспортними засобами і ащювати зі складними механізмами.

засодія з іншими лікарськими засобами та інші форми взаємодії. Не встановлена.

армакологічні властивості. Активність Келтікану забезпечують фосфатні групи, що зобідні для об'єднання моносахаридів з керамідами для утворення цереброзидів і фосфатидних слот, які є основою сфінгомієліну і гліцерофосфоліпідів. Сфінгомієлін і гліцерофосфоліпіди є новними компонентами мієлінової оболонки. Препарат Келтікан має трофічні властивості і рияє регенерації аксонів нервової тканини.

армацевтичні характеристики.

сновні фізико-хімічні властивості: тверді капсули з блакитною кришечкою і сірим корпусом. міст капсул являє собою білий гігроскопічний порошок.

рмін придатності. 2 роки.

мови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30°C.

паковка. По 15 капсул у блістері. По 2 блістери в картонній коробці.

атегорія відпуску. За рецептом.

робник. „Феррер Інтернаціональ, С.А.”, Іспанія / „Ferrer Internacional S. A.”, Spain.
редставлено в Україні «Нікомед Австрія ГмбХ», Австрія.

ісцезнаходження. 08028 Барселона, Гран Віа Карлос III, 94, Іспанія.