

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ТРОКСЕГЕЛЬ®
(TROXEGEL®)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: troxerutin;

1 г гелю містить троксерутину 20 мг;

допоміжні речовини: карбомер 934Р (карбопол 934Р), трометамін (трометамол), динатрію едетат (трилон Б), бензалконію хлорид, вода очищена.

Лікарська форма. Гель.

Гель прозорий, желеподібний, жовтого або жовтого з зеленуватим відтінком кольору, зі слабким характерним запахом, однорідний за консистенцією.

Назва і місцезнаходження виробника. ВАТ “Київмедпрепарат”. Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139.

Фармакотерапевтична група. Капіляростабілізуючі (капіляропротекторні) засоби.

Код АТС С05С А04.

Препарат чинить венотонізуючу, ангіопротекторну, протизапальну, протинабрякову, антиоксидантну дію. Як похідне флавонолу рутину, троксерутин виявляє Р-вітамінну активність, бере участь в окисно-відновних процесах, блокує гіалуронідазу, стабілізує гіалуронову кислоту клітинних оболонок і зменшує їх проникність. Троксерутин підвищує тонус стінок капілярів, збільшує щільність судинної стінки, зменшує ексудацію рідкої частини плазми та діapedез клітин крові, знижує ексудативне запалення в судинній стінці.

При зовнішньому застосуванні добре всмоктується з поверхні шкіри, забезпечуючи достатню концентрацію діючої речовини у прилеглих тканинах, при цьому не чинить системної дії.

Показання для застосування.

- Венозна недостатність;
- передварикозний і варикозний синдром;
- поверхневий тромбофлебіт, флебіт і післяфлебітні стани;
- комплексне лікування гемороїдальної хвороби;
- набряково-больовий синдром при травмах і варикозному розширенні вен;
- спазми литкових м'язів.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату.

Особливі застереження.

Гель не слід наносити на відкриті рани, екзематозні ділянки шкіри та на слизові оболонки.

При рецидиві захворювання курс лікування можна повторювати 2-3 рази на рік.

Гель можна застосовувати при накладанні компресів.

Хворим із хронічною венозною недостатністю рекомендується застосування препарату як на початкових, так і на пізніх стадіях захворювання (внаслідок лікування зникає відчуття важкості в ногах, зменшується набряклість нижніх кінцівок, покращується трофіка).

Хворим з вираженими порушеннями функції нирок не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Під час вагітності і лактації немає обмежень для застосування препарату.

Діти.

Троксегель® можна застосовувати дітям.

Спосіб застосування та дози.

Препарат наносять 2-3 рази на день рівномірним тонким шаром на уражену ділянку від дистальної до проксимальної частини, обережно втираючи до повного всмоктування. При лікуванні геморою препарат не втирати.

Курс лікування становить від 2 тижнів до 1-2 місяців.

Передозування.

На сьогодні даних про передозування немає.

При випадковому прийомі внутрішньо необхідно застосовувати загальні заходи виведення препарату з організму (викликати блювання та звернутися до лікаря). За наявності показань застосовують перитонеальний діаліз. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

При підвищеній чутливості в деяких хворих можливі алергічні реакції (висип, свербіж, почервоніння шкірних покривів), дерматит.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Посилює дію аскорбінової кислоти на структуру та проникність судинної стінки.

Термін придатності. 3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

Упаковка. По 40 г у тубі.

Категорія відпуску. Без рецепта.