

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 10 %
(UNGUENTUM STREPTOCIDI 10 %)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 г мазі містить сульфаніламід 0,1 г;
допоміжні речовини: парафін білий м'який.

Лікарська форма. Мазь 10 %.

Мазь білого або світло-жовтого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика» або ТОВ "Тернофарм".
Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Фармакотерапевтична група.

Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування. Сульфаніламід. Код АТС D06B A06**.

Фармакологічні властивості. Препарат виявляє антимікробний вплив на стрептококи та інші мікроорганізми. Стрептоцид порушує процес асиміляції мікробною клітиною факторів її росту – фолієвої, дигідрофолієвої кислот та інших сполук, які мають у своєму складі пара-амінобензойну кислоту (ПАБК). Завдяки схожості хімічної структури ПАБК і сульфаніламід, останній як конкурентний антагоніст кислоти включається в метаболізм мікроорганізмів і порушує його.

Показання для застосування.

Виразки, опіки, тріщини, рани, піодермії, бешихове запалення та інші патологічні гнійно-запальні процеси шкіри, які супроводжуються присутністю мікроорганізмів або спричинені останніми.

Протипоказання.

Препарат протипоказаний при підвищеній чутливості до сульфаніламідних засобів, ниркової недостатності, гострій порфірії, а також у періоди вагітності та годування груддю.

Небезпечні заходи безпеки при застосуванні.

При появі алергічної реакції в місці нанесення мазі, слід припинити застосування препарату.
Передчасне припинення лікування препаратом може спричинити розвиток стійких до сульфаніламідів мікроорганізмів.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат протипоказаний.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Безпека та ефективність застосування Стрептоцидової мазі у дітей не встановлені, тому застосовувати препарат дітям не рекомендується.

Спосіб застосування та дози.

Стрептоцидову мазь наносять тонким шаром на уражену ділянку, у тому числі під марлеву пов'язку. Кратність та тривалість застосування залежить від тяжкості захворювання, досягнутого терапевтичного ефекту і визначається лікарем.

Передозування.

Не виявлено.

Побічні ефекти.

При підвищеній чутливості до сульфаніламідних засобів можливі місцеві алергічні реакції, розвиток яких потребує негайної відміни препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Під час застосування Стрептоцидової мазі небажано приймати такі препарати як дигітосин, кислоту хлористоводневу, кофеїн, мезатон, фенобарбітал, адреналіну гідрохлорид.

Термін придатності.

5 роки.

Умови зберігання.

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище + 25 С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 г, 25 г у банках; по 25 г у тубах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.