

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА
(CALENDULA OFFICINALIS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить настойки квіток календули (1:10) 50 мл;

допоміжна речовина: етанол 70 %.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина жовтувато-бурого кольору з характерним запахом. Можливе випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

Державне підприємство “Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України”.

Україна, 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15а.

Фармакотерапевтична група.

Препарати, що сприяють загоюванню ран. Код АТС D03A X09.

Біологічно активні речовини, що містяться в квітках та квіткових кошиках календули (флавоноїдні та каротиноїдні глікозиди, сапоніни, дубильні речовини, ефірна олія, органічні кислоти), чинять протимікробну, протизапальну та помірну жовчогінну дію.

Показання для застосування.

Місцево як антисептичний засіб при інфікованих (гнійних) ранах, порізах, опіках шкіри та при запаленні слизових оболонок порожнини рота, ясен (стоматит, гінгівіт), глотки, мигдаликів (фарингіт, ангіна); внутрішньо – як жовчогінний засіб при дискінезіях жовчовивідних шляхів, холангітах, холециститах (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Препарат протипоказаний при індивідуальній непереносимості біологічно активних речовин, що містяться в лікарській рослинній сировині.

Оскільки до складу препарату входить етанол, календули настойку внутрішньо не слід призначати дітям віком до 12 років і жінкам у період вагітності та годування груддю.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Перед початком лікування препаратом слід обов'язково порадитися з лікарем.

Препарат містить спирт! Не рекомендується застосування препарату протягом тривалого часу.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настойку не рекомендується застосовувати жінкам у періоди вагітності і годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Слід дотримуватися обережності при прийманні лікарського засобу внутрішньо через те, що препарат впливає на здатність керувати автомобілем та іншими механізмами. Седативний ефект розвивається повільно, протягом трьох тижнів.

Інструкцію завантажено з сайту www.dovgolit.com

Діти.

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, настоянку не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування та дози.

Календули настоянку приймають внутрішньо за 15 - 30 хв до їди, розводячи у невеликій кількості теплої кип'яченої води.

Дорослим рекомендується застосовувати 10 - 20 крапель настоянки 3 - 4 рази на день.

Дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля настоянки на 1 рік життя 3 - 4 рази на день.

Для полоскання порожнини рота 1 чайну ложку календули настоянки розводять у склянці теплої кип'яченої води.

Спосіб застосування препарату для місцевих аплікацій залежить від характеру ураження шкіри та слизових оболонок і визначається лікарем.

Тривалість курсу лікування визначають індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням характеру, ступеня тяжкості та особливостей перебігу захворювання, стабільності досягнутого терапевтичного ефекту і переносимості препарату.

Передозування.

Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти.

Препарат, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих при індивідуальній підвищеній чутливості можливий розвиток алергічних реакцій (почервоніння шкіри, висипи, свербіж, ангіоневротичний набряк тощо). При прийомі внутрішньо можливе відчуття гіркоти в роті, відчуття печіння в епігастральній ділянці, біль у животі.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Календули настоянка посилює дію інших протизапальних та жовчогінних засобів (зокрема препаратів на основі ромашки та деревію).

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

Термін придатності.

2 роки.

Умови зберігання.

Зберігати препарат у захищеному від світла місці при температурі не більше 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.